

Tubenschulter

Farbe: schwarz blau PMS 299C

23.08.2005/cw

— Bitte Tube auf den Kopf stellen —

Thrombocutan® Ultra Gel 60.000

Wirkstoff: Heparin-Natrium


Zum Auftragen auf die Haut

100 g Gel N2

Zul.-Nr. 34281.00.00

Apothekenpflichtig

Bitte Gebrauchsinformation beachten!



PZN -0234399

mibe GmbH
Arzneimittel**Gebrauchsinformation**

Zusammensetzung: Arzneilich wirksamer Bestandteil: 100 g Gel enthalten 0,386 g (0,273 - 0,500 g) Heparin-Natrium (aus Schweinedermismukus; Gehalt mind. 120 I.E./mg), entspr. 60.000 I.E./Sonstige Bestandteile: Carborner 980, Trometamol, Macrogol-Glycerol-Hydroxyesterat, 2-Fropanol, Lavendelöl, Citronellöl, geringigtes Wasser.

Enthält Propylenglycol – kann Allergien auslösen.

Darreichungsform und Inhalt: Originalpackung mit 100 g Gel

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

mibe GmbH Arzneimittel
Münchener Straße 15
06796 Brehna

Telefon: 03 49 54/2 47-0
Telefax: 03 49 54/2 47-100

Anwendungsgebiete: Zur unterstützenden Behandlung bei akuten Schwellungszuständen nach stumpfen Traumen (Frellungen, Blutergüssen), oberflächlicher Venenentzündung, sofern diese nicht durch Kompression behandelt werden kann.

Gegenanzeigen: Bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Bestandteile von Thrombocutan® Ultra Gel 60.000 soll dieses Arzneimittel nicht angewendet werden. Bisherige Erfahrungen mit der Anwendung bei Schwangeren und Stillenden haben keine Anhaltspunkte für schädigende Wirkungen ergeben. Heparin ist nicht plazentagängig und tritt nicht in die Muttermilch über.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

und Warnhinweise: Thrombocutan® Ultra Gel 60.000 soll nicht auf offene Wunden und/oder nässende Ekzeme aufgebracht werden.

Hinweis: Bei sehr großflächiger Anwendung und gleichzeitiger Behandlung mit blutgerinnungshemmenden Mitteln (Antikoagulantien, Acetylsalicylsäure) kann die Blutungsneigung verstärkt werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind bei örtlicher Anwendung nicht bekannt (siehe auch „Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise“).

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:

Thrombocutan® Ultra Gel 60.000 soll 2–3 mal täglich dünn und gleichmäßig auf das Erkrankungsgebiet aufgetragen werden.

Über die Dauer der Anwendung entscheidet der Arzt. Wenn nicht anders verordnet, sollen Sie Thrombocutan® Ultra Gel 60.000 ca. 1–2 Wochen anwenden.

Überdosierung und andere Anwendungsfehler:

Bei bestimmungsgemäßer Anwendung sind keine Überdosierungserscheinungen bekannt.

Nebenwirkungen: Allergische Reaktionen auf Heparin sind bei Anwendung auf der Haut selten ($\leq 0,01\%$ - $< 0,1\%$), jedoch können in Einzelfällen allergische Reaktionen wie Rötung der Haut und Juckreiz auftreten, die nach Absetzen des Präparates in der Regel rasch verschwinden. Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Gebrauchsinformation aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit. Thrombocutan® Ultra Gel 60.000 sollte bei Auftreten von allergischen Hautreaktionen abgesetzt werden. Bitte informieren Sie hiervon Ihren Arzt. Darüber hinaus sind keine weiteren besonderen Maßnahmen notwendig.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels: Das Verfallsdatum dieses Arzneimittels ist auf der Tube aufgedruckt. Verwenden Sie dieses Arzneimittel nicht mehr nach diesem Datum! Haltbarkeit nach Anbruch der Tube: 3 Monate.

Nicht über 25°C lagern.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Stand der Information: August 2005

Ch.-B./Verwendbar bis: siehe Tubenfuß