

Gebrauchsanweisung – bitte aufmerksam lesen

BAUSCH+LOMB

Vividrin® ectoin® EDO Augentropfen

Sehr geehrte Anwenderin, sehr geehrter Anwender,

bitte lesen Sie diese Information aufmerksam, bevor Sie **Vividrin® ectoin® EDO Augentropfen** anwenden. **HEBEN SIE DIESE GEBRAUCHSANWEISUNG AUF; DENN SIE ENTHÄLT WICHTIGE INFORMATIONEN.** Bei Fragen zu **Vividrin® ectoin® EDO Augentropfen** wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker oder direkt an uns.

1. Was sind Vividrin® ectoin® EDO Augentropfen und wofür werden sie angewendet?

Vividrin® ectoin® EDO Augentropfen sind ein Medizinprodukt, das 2 % Ectoin enthält - ein natürliches, zellschützendes Molekül mit entzündungslindernden und membranstabilisierenden Eigenschaften, sowie Hyaluronsäure, welche durch ihr hohes Wasserbindungsvermögen das Auge beruhigt.

- **Vividrin® ectoin® EDO Augentropfen** sind eine isotonische Lösung und können zur unterstützenden Behandlung sowie zur Vorbeugung von Symptomen bei einer saisonalen als auch ganzjährigen allergischen Bindehautentzündung aufgrund allergischer Einflüsse wie z. B. Pollen, Hausstaubmilben, Tierhaare und Schimmelpilze angewendet werden. Juckende, gereizte, rote oder tränende Augen werden effektiv gelindert.
- **Vividrin® ectoin® EDO Augentropfen** stabilisieren den natürlichen Tränenfilm und haben einen positiven Einfluss auf die wässrige Phase (Hyaluronsäure) als auch auf die Lipid-Phase (Ectoin) des Tränenfilms. Durch dieses duale Wirkprinzip wird das Auge vor schädlichen Allergeneinflüssen geschützt und der Regenerationsprozess der gereizten und sensiblen Bindehaut unterstützt.
- **Vividrin® ectoin® EDO Augentropfen** enthalten keinerlei Konservierungsstoffe und sind auch für Kontaktlinsträger sowie für Personen mit empfindlichen Augen geeignet.

2. Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

- **Vividrin® ectoin® EDO Augentropfen** sollten im Falle einer Überempfindlichkeit gegenüber Ectoin, Hyaluronsäure oder einem der anderen Inhaltsstoffe der Augentropfen nicht angewendet werden.
- Wenn vom Arzt empfohlen, können **Vividrin® ectoin® EDO Augentropfen** auch nach Augenoperationen und/oder Verletzungen angewendet werden.
- Falls es zu allergischen Reaktionen kommt, muss die Anwendung von **Vividrin® ectoin® EDO Augentropfen** sofort beendet werden.
- **Vividrin® ectoin® EDO Augentropfen** enthalten zur besseren Verträglichkeit keine Konservierungsmittel, daher muss eine geöffnete EDO nach dem Gebrauch verworfen werden. Sie ist nicht zum späteren Gebrauch vorgesehen.
- **Vividrin® ectoin® EDO Augentropfen** sind in kleine Ein-Dosis-Ophthalmien (EDO) abgefüllt, die von kleinen Kindern verschluckt werden können (Erstickungsgefahr). **Vividrin® ectoin® EDO Augentropfen** sollten außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
- **Vividrin® ectoin® EDO Augentropfen** können zusammen mit Kontaktlinsen (weichen und harten) angewendet werden. Es sind keine Wechselwirkungen zwischen **Vividrin® ectoin® EDO Augentropfen** und Kontaktlinsen bekannt.
- Beschädigte oder offene Ein-Dosis-Ophthalmien dürfen nicht verwendet werden.

3. Was sollten Sie vor der Anwendung von Vividrin® ectoin® EDO Augentropfen wissen?

Es sind keine Wechselwirkungen zwischen **Vividrin® ectoin® EDO Augentropfen** und anderen Augentropfen oder lokal am Auge angewendeten Salben bekannt.

Warten Sie nach der Anwendung von **Vividrin® ectoin® EDO Augentropfen** mindestens 15 Minuten, bevor Sie ein anderes Medizinprodukt oder Arzneimittel am Auge anwenden.

4. Was sollte während einer Schwangerschaft oder Stillzeit beachtet werden?

Es liegen derzeit keine Daten zur Anwendung von **Vividrin® ectoin® EDO Augentropfen** während der Schwangerschaft und Stillzeit vor.




Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker um Rat, wenn Sie:

- schwanger sind oder stillen
- nicht sicher sind, ob Sie schwanger sind.

5. Wie wenden Sie Vividrin® ectoin® EDO Augentropfen an?

Wenden Sie **Vividrin® ectoin® EDO Augentropfen** stets entsprechend dieser Gebrauchsanweisung an. Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker vor der Anwendung um Rat, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Wenn von Ihrem Arzt nicht anders verordnet, geben Sie mehrmals täglich 1-2 Tropfen in jedes Auge. Kinder unter 10 Jahren sollten bei der Anwendung von **Vividrin® ectoin® EDO Augentropfen** von einem Erwachsenen unterstützt werden.



1. Halten Sie eine Ein-Dosis-Ophthalmie (EDO) an der etikettierten Seite fest und trennen Sie die EDO vom Riegel ab.
2. Öffnen Sie die Ein-Dosis-Ophthalmie, indem Sie die Verschlusskappe abdrehen.
3. Neigen Sie den Kopf leicht nach hinten und ziehen Sie mit dem Finger der freien Hand vorsichtig Ihr unteres Augenlid leicht nach unten. Halten Sie die EDO möglichst senkrecht mit der Öffnung nach unten über das geöffnete Auge und drücken Sie die EDO leicht zusammen, um einen Tropfen in den Bindehautsack zu geben.
4. Schließen Sie anschließend das Auge, bewegen Sie es leicht hin und her und blinzeln Sie, um den Tropfen optimal auf der Augenoberfläche zu verteilen.
5. Wiederholen Sie die Anwendung am anderen Auge.
6. Vermeiden Sie den Kontakt der Öffnung der EDO mit Ihren Augen oder Fingern, um eine Verunreinigung der Lösung zu vermeiden.

6. Mögliche Nebenwirkungen von Vividrin® ectoin® EDO

Vividrin® ectoin® EDO Augentropfen sind gut verträglich. Bis zum jetzigen Zeitpunkt sind keine Nebenwirkungen bekannt.

In einzelnen Fällen kann die Anwendung von **Vividrin® ectoin® EDO Augentropfen** eine kurzzeitige Augenirritation, Augenrötung oder Bindehautentzündung verursachen. Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, falls Sie Nebenwirkungen im Zusammenhang mit der Anwendung von **Vividrin® ectoin® EDO Augentropfen** bemerken.

Falls die Beschwerden anhalten oder sich verschlimmern, kontaktieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

7. Wie werden Vividrin® ectoin® EDO Augentropfen aufbewahrt?

Das Mindestverwendbarkeitsdatum von **Vividrin® ectoin® EDO Augentropfen** ist auf der Verpackung und auf den Ein-Dosis-Ophthalmien zu finden.

Vividrin® ectoin® EDO Augentropfen dürfen nach Ablauf des Mindestverwendbarkeitsdatums nicht mehr verwendet werden.


Vividrin® ectoin® EDO Augentropfen sollten bei 2-25°C aufbewahrt werden.

Wo erhalten Sie Vividrin® ectoin® EDO Augentropfen?**Welche Packungsgrößen stehen zur Verfügung?**

Vividrin® ectoin® EDO Augentropfen sind rezeptfrei in Packungen zu 10 x 0,5 ml in Apotheken erhältlich.











Inhaltsstoffe

Ectoin 2 %, Natriumchlorid, Hyaluronsäure, Wasser

8. Hersteller
 bitop AG, Stockumer Str. 28, 58453 Witten,
Deutschland
**Vertrieb**Dr. Gerhard Mann chem.-pharm. Fabrik GmbH, Brunsbütteler Damm 165-173, 13581 Berlin
(ein Unternehmen von Bausch + Lomb Incorporated)E-Mail: kontakt@bausch.com
www.vividrin.de**9. Stand der Information**

Juli 2015, Rev. 01

Erläuterung der auf dem Produkt verwendeten Symbole

	CE-Symbol mit Nummer der benannten Stelle
	Hersteller
	Gebrauchsanweisung beachten.
	Verwendbar bis
	Chargennummer
	Sterilisiert durch aseptische Filtration
	Temperaturbegrenzung
	Verwenden Sie keine beschädigten Ein-Dosis-Ophtiolen
	Achtung: Warnhinweise beachten!
	Nicht wiederverwenden. Entsorgen Sie verbleibende Lösung.