

# Gebrauchsinformation: Information für Anwender

Ambroxol WICK Schleimlöser für Kinder 3 mg/ml Lösung zum Einnehmen  
Lösung zum Einnehmen

Für Kinder ab 2 Jahren, Jugendliche und Erwachsene.  
Für Kinder unter 2 Jahren nur unter ärztlicher Kontrolle.

Wirkstoff: Ambroxolhydrochlorid

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

Wenn Sie sich nach 4-5 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

**Was in dieser Packungsbeilage steht**

1. Was ist Ambroxol WICK Schleimlöser für Kinder und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Ambroxol WICK Schleimlöser für Kinder beachten?
3. Wie ist Ambroxol WICK Schleimlöser für Kinder einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Ambroxol WICK Schleimlöser für Kinder aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

## **1. Was ist Ambroxol WICK Schleimlöser für Kinder und wofür wird es angewendet?**

Ambroxol WICK Schleimlöser für Kinder ist ein Arzneimittel zur Schleimlösung bei Atemwegserkrankungen mit zähem Schleim (Expektorans). Ambroxol WICK Schleimlöser für Kinder wird angewendet zur schleimlösenden Behandlung bei akuten und chronischen Erkrankungen der Bronchien und der Lunge mit zähem Schleim.

## **2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Ambroxol WICK Schleimlöser für Kinder beachten?**

Ambroxol WICK Schleimlöser für Kinder **darf nicht eingenommen werden,**

- wenn Sie allergisch gegen Ambroxol oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

## **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Ambroxol WICK Schleimlöser für Kinder einnehmen.

- wenn Sie an einer eingeschränkten Nierenfunktion oder einer schweren Lebererkrankung leiden. Sie dürfen Ambroxol WICK Schleimlöser für Kinder dann nur in größeren zeitlichen Abständen oder verminderter Dosis einnehmen.
- wenn Sie an einer seltenen Erkrankung der Bronchien, die mit übermäßiger Sekretansammlung einhergeht (z. B. malignes Ziliensyndrom), leiden. Wegen eines möglichen Sekretstaus sollten Sie Ambroxol WICK Schleimlöser für Kinder in diesem Fall nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt einnehmen.
- Ambroxol WICK Schleimlöser für Kinder darf bei Kindern unter 2 Jahren nur unter ärztlicher Kontrolle angewendet werden.
- Sehr selten ist über das Auftreten von schweren Hautreaktionen wie Stevens-Johnson-Syndrom und Lyell-Syndrom in zeitlichem Zusammenhang mit der Anwendung von Ambroxol berichtet worden. Bei Neuauftreten von Haut- und Schleimhautveränderungen sollten Sie daher unverzüglich ärztlichen Rat einholen und die Anwendung von Ambroxol beenden.

**Einnahme von Ambroxol WICK Schleimlöser für Kinder zusammen mit anderen Arzneimitteln**  
Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

Wenn Sie Ambroxol WICK Schleimlöser für Kinder in Kombination mit hustenstillenden Mitteln (Antitussiva) einnehmen, kann der verflüssigte Schleim eventuell nicht mehr ausreichend abgehustet werden. Fragen Sie daher vor einer kombinierten Anwendung unbedingt Ihren Arzt.

### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Bisher liegen keine ausreichenden Erfahrungen am Menschen vor. Sie sollten Ambroxol WICK Schleimlöser für Kinder daher während der Schwangerschaft, insbesondere während des ersten Drittels, nur nach Anordnung Ihres Arztes und nur nachdem dieser eine sorgfältige Nutzen-Risiko-Abwägung vorgenommen hat, einnehmen.

Der Wirkstoff aus Ambroxol WICK Schleimlöser für Kinder geht beim Tier in die Muttermilch über. Da bisher keine ausreichenden Erfahrungen am Menschen vorliegen, sollten Sie Ambroxol WICK Schleimlöser für Kinder während der Stillzeit nur auf Anordnung Ihres Arztes einnehmen.

### **Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Ambroxol WICK Schleimlöser für Kinder **enthält Sorbitol**.

Bitte nehmen Sie *Ambroxol WICK Schleimlöser für Kinder 3 mg/ml Lösung zum Einnehmen* daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

Der Kalorienwert beträgt 2,6 kcal/g Sorbitol. Sorbitol kann eine leicht abführende Wirkung haben. 5 ml Ambroxol WICK Schleimlöser für Kinder enthalten 2,1 g Sorbitol (entsprechend 0,18 BE).

### **3. Wie ist Ambroxol WICK Schleimlöser für Kinder einzunehmen?**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt

#### Kinder bis 2 Jahre\*\*

nehmen 2-mal täglich je 2,5 ml Saft\* (entsprechend 15 mg Ambroxolhydrochlorid/Tag) ein.

#### Kinder von 2 bis 5 Jahren

nehmen 3-mal täglich je 2,5 ml Saft\* (entsprechend 22,5 mg Ambroxolhydrochlorid/Tag) ein.

#### Kinder von 6 bis 12 Jahren

nehmen 2–3-mal täglich je 5 ml Saft\* (entsprechend 30–45 mg Ambroxolhydrochlorid/Tag) ein.

#### Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene

nehmen im Allgemeinen während der ersten 2–3 Tage 3-mal täglich je 10 ml Saft\* (entsprechend 90 mg Ambroxolhydrochlorid/Tag) ein, danach 2-mal täglich je 10 ml Saft\* (entsprechend 60 mg Ambroxolhydrochlorid/Tag).

\* Zum Abmessen der Dosis liegt der Packung ein entsprechend markierter Messbecher bei.

Kinder bis 2 J.**	Kinder 2 - 5 J.	Kinder 6 - 12 J.	Jugendliche ab 12 J. und Erwachsene erste 2 - 3 Tage	ab dem 3. - 4. Tag
2,5 ml	2,5 ml	5 ml	2 x 5 ml	2 x 5 ml
2 x täglich	3 x täglich	2 - 3 x täglich	3 x täglich	2 x täglich

\*\* nur unter ärztlicher Kontrolle

Nehmen Sie den Saft nach den Mahlzeiten mit Hilfe des Messbechers ein.

Hinweis:

Die schleimlösende Wirkung von Ambroxol WICK Schleimlöser für Kinder wird durch Flüssigkeitszufuhr verbessert.

Hinweis:

Wenn Sie an einer eingeschränkten Nierenfunktion oder einer schweren Lebererkrankung leiden, müssen Sie die Einnahmeabstände von Ambroxol WICK Schleimlöser für Kinder vergrößern oder die Dosis vermindern.

#### **Wie lange sollten Sie Ambroxol WICK Schleimlöser für Kinder einnehmen?**

Nehmen Sie Ambroxol WICK Schleimlöser für Kinder ohne ärztlichen Rat nicht länger als 4-5 Tage ein. Wenn nach dieser Zeit keine Besserung eintritt oder sich Ihr Krankheitsbild verschlimmert, sollten Sie einen Arzt aufsuchen.

#### **Wenn Sie eine größere Menge von Ambroxol WICK Schleimlöser für Kinder eingenommen haben, als Sie sollten**

Schwerwiegende Vergiftungserscheinungen sind bei Überdosierung von Ambroxol nicht beobachtet worden. Es wurde über kurzzeitige Unruhe und Durchfall berichtet. Bei versehentlicher oder beabsichtigter extremer Überdosierung können vermehrte Speichelsekretion, Würgereiz, Erbrechen und Blutdruckabfall auftreten.

Falls Sie Ambroxol WICK Schleimlöser für Kinder in zu großen Mengen eingenommen haben, setzen Sie sich bitte mit einem Arzt in Verbindung. Akutmaßnahmen, wie Auslösen von Erbrechen und Magenspülung, sind nicht generell angezeigt und nur bei extremer Überdosierung zu erwägen. Empfohlen wird eine Behandlung entsprechend den auftretenden Erscheinungen der Überdosierung.

#### **Wenn Sie die Einnahme von Ambroxol WICK Schleimlöser für Kinder vergessen haben**

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein. Wenn Sie einmal vergessen haben, Ambroxol WICK Schleimlöser für Kinder einzunehmen, oder zu wenig eingenommen haben, setzen Sie bitte beim nächsten Mal die Einnahme von Ambroxol WICK Schleimlöser für Kinder wie in der Dosierungsanleitung beschrieben fort.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

#### **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

<b>Sehr häufig</b>	(mehr als 1 Behandler von 10)
<b>Häufig</b>	(1 bis 10 Behandelte von 100)
<b>Gelegentlich</b>	(1 bis 10 Behandelte von 1.000)
<b>Selten</b>	(1 bis 10 Behandelte von 10.000)
<b>Sehr selten</b>	(weniger als 1 Behandler von 10.000)
<b>Nicht bekannt</b>	(Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar)

#### *Störungen des Immunsystems*

Gelegentlich: Überempfindlichkeitsreaktionen (allergische Reaktionen), z. B. Hautausschlag, Gesichtsschwellungen, Atemnot, Juckreiz, Fieber

Sehr selten: schwere allergische (anaphylaktische) Reaktionen bis hin zum Schock

### *Störungen des Magen-Darm-Trakts*

Gelegentlich: Übelkeit, Bauchschmerzen, Erbrechen

Bei den ersten Anzeichen einer Überempfindlichkeitsreaktion darf Ambroxol WICK Schleimlöser für Kinder nicht nochmals eingenommen werden. Informieren Sie Ihren Arzt, damit dieser über den Schweregrad und gegebenenfalls erforderliche weitere Maßnahmen entscheiden kann.

### **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

### **5. Wie ist Ambroxol WICK Schleimlöser für Kinder aufzubewahren?**

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und Umkarton nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

#### Hinweis auf Haltbarkeit nach Anbruch oder Zubereitung

Das Arzneimittel ist nach dem Öffnen 12 Monate, aber höchstens bis zu dem auf dem Umkarton/dem Etikett genannten Verfalldatum haltbar.

### **6. Inhalt der Packung und weitere Informationen**

#### **Was Ambroxol WICK Schleimlöser für Kinder enthält**

Der Wirkstoff ist: Ambroxolhydrochlorid.

5 ml Lösung zum Einnehmen enthalten 15 mg Ambroxolhydrochlorid.

Die sonstigen Bestandteile sind:

Sorbitol (E420), Propylenglycol, Himbeer-Aroma, Saccharin, Gereinigtes Wasser.

#### **Wie Ambroxol WICK Schleimlöser für Kinder aussieht und Inhalt der Packung**

Klare, farblose bis leicht gelbliche Lösung.

Ambroxol WICK Schleimlöser für Kinder ist in Flaschen mit 100 ml und 250 ml Lösung zum Einnehmen erhältlich.

### **Pharmazeutischer Unternehmer**

WICK Pharma

Zweigniederlassung der Procter & Gamble GmbH

D-65823 Schwalbach

Tel.: 0800-9425847

### **Hersteller**

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Str. 3

89143 Blaubeuren

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im  
Dezember 2013**

Versionscode: Z10