

Zovirax® Augensalbe 30 mg/g Augensalbe

Aciclovir

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Zovirax und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Zovirax beachten?
3. Wie ist Zovirax anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Zovirax aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS IST ZOVIRAX UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Zovirax ist ein Arzneimittel, welches das Wachstum bestimmter Viren hemmt (Virustatikum, Virus-DNA-Polymerasehemmstoff).

Die Zovirax Augensalbe wird angewendet zur Behandlung der durch das Herpes-simplex-Virus hervorgerufenen Hornhautentzündung des Auges.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON ZOVIRAX BEACHTEN?

Zovirax darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Aciclovir oder Valaciclovir oder einen der in Abschnitt 6 aufgeführten sonstigen Bestandteile von Zovirax Augensalbe sind.

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Zovirax ist erforderlich,

- wenn Sie Kontaktlinsenträger sind. Kontaktlinsen sollen während einer Herpes-Erkrankung der Hornhaut und ihrer Behandlung mit Zovirax nicht getragen werden.

Bei Anwendung von Zovirax mit anderen Arzneimitteln

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen / anwenden bzw. vor kurzem eingenommen / angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln sind bisher nicht bekannt geworden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Fragen Sie vor der Einnahme/Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Die nach Markteinführung über alle verfügbaren Darreichungsformen und Stärken von Zovirax in einem so genannten Schwangerschaftsregister dokumentierten Daten zur Anwendung während der Schwangerschaft zeigten keine erhöhte Missbildungsrate im Vergleich zur normalen Bevölkerung. Die aufgetretenen Missbildungen waren nicht einheitlich, so dass nicht auf eine gleiche Ursache geschlossen werden kann.

Sollte sich eine Anwendung während der Schwangerschaft als notwendig erweisen, so sind der Nutzen und die möglichen Risiken von Ihrem Arzt sorgfältig gegeneinander abzuwägen.

Nach systemischer Anwendung geht Aciclovir in die Muttermilch über. Jedoch ist die Dosis, die ein Kind nach Anwendung von Zovirax Augensalbe bei der Mutter durch das Stillen aufnehmen würde, vernachlässigbar.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Dieses Arzneimittel kann aufgrund seiner fettartigen Beschaffenheit zu vorübergehender Beeinträchtigung des Sehvermögens führen. Falls Sie in Betracht ziehen, ein Kraftfahrzeug zu führen, ohne sicheren Halt zu arbeiten oder Werkzeuge oder Maschinen zu bedienen, sollten Sie Ihren Arzt um Rat fragen.

3. WIE IST ZOVIRAX ANZUWENDEN?

Wenden Sie Zovirax immer genau nach Anweisung des Arztes an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, wird ein etwa 1 cm langer Salbenstrang 5-mal täglich alle 4 Stunden in den unteren Bindehautsack eingebracht.

Durch Herunterziehen des unteren Lids wird der Bindehautsack frei, in den dann der Salbenstrang eingebracht wird. Durch Schließen der Lider und Bewegen des Augapfels erfolgt eine Verteilung des Salbenstrangs.

Nach Abheilung der Hornhautentzündung soll die Behandlung noch mindestens 3 Tage lang weitergeführt werden.

Wenn Sie eine größere Menge von Zovirax angewendet haben, als Sie sollten

Wenn Sie versehentlich zu viel angewendet haben und dabei vermehrt Nebenwirkungen auftreten oder Sie sich unsicher sind, sollten Sie Ihren Arzt oder Apotheker informieren, um weiteren Rat einzuholen.

Wenn Sie die Anwendung von Zovirax vergessen haben

Wenden Sie nicht die doppelte Dosis an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann Zovirax Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Sehr häufige Nebenwirkungen (bei mehr als 1 von 10 Patienten berichtet)

- oberflächliche Hornhautdefekte (Keratitis superficialis punctata).

Diese erfordern in der Regel keine vorzeitige Beendigung der Behandlung und heilen ohne Folgeerscheinungen aus.

Häufige Nebenwirkungen (bei weniger als 1 von 10 Patienten berichtet)

- vorübergehendes leichtes Brennen kurz nach Anwendung am Auge, Bindehautentzündung (Konjunktivitis).

Seltene Nebenwirkungen (bei weniger als 1 von 1.000 Patienten berichtet)

- oberflächliche entzündliche Reaktion des unteren Hornhautrandes (Blepharitis).

Sehr seltene Nebenwirkungen (bei weniger als 1 von 10.000 Patienten berichtet)

- plötzlich auftretende Überempfindlichkeitsreaktionen einschließlich Angioödem (Quincke-Ödem, blasse Schwellung der Haut vor allem im Gesichtsbereich) und Nesselsucht (Urtikaria, juckender Hautausschlag).

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. WIE IST ZOVIRAX AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und dem Behältnis angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Angebrochene Tuben dürfen nur 1 Monat lang verwendet werden.

Nicht über 25 °C aufbewahren!

Das Arzneimittel darf nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall entsorgt werden. Fragen Sie Ihren Apotheker wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr benötigen. Diese Maßnahme hilft die Umwelt zu schützen.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was Zovirax enthält

- Der Wirkstoff ist: Aciclovir. 1 g Augensalbe enthält 30 mg Aciclovir.
- Der sonstige Bestandteil ist: Weißes Vaselin.

Wie Zovirax aussieht und Inhalt der Packung

Die Augensalbe ist weiß bis gebrochen weiß und nahezu geruchsneutral. Zovirax 30 mg/g Augensalbe ist in einer kunststoffbeschichteten Aluminiumtube mit Polyethylenschraubverschluss zu je 4,5 g Augensalbe erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Pharmazeutischer Unternehmer

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG, 80700 München; Service-Tel.: 0180 34 56 400; <http://www.glaxosmithkline.de>

Hersteller

Glaxo Operations UK Ltd, Glaxo Wellcome Operations, Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, Vereinigtes Königreich

Weitere Informationen:

Um einen wirkungsvollen Einfluss auf den Infektionsverlauf zu ermöglichen, sollte bei Herpes-Erkrankungen des Auges so früh wie möglich mit der Behandlung begonnen werden.

Während der Behandlung mit Zovirax Augensalbe sollten Sie in engem Kontakt mit Ihrem Arzt stehen (z. B. 2- bis 3-mal wöchentlich Arztbesuche).

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im Juli 2011