

Iberogast®

Pflanzliches Arzneimittel



Flüssigkeit

Lesen Sie bitte die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist auch ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muß Iberogast® jedoch vorschriftsgemäß eingenommen werden.

- Heben Sie bitte die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie bitte Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Iberogast® und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Iberogast® beachten?
3. Wie ist Iberogast® einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Iberogast® aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. Was ist Iberogast® und wofür wird es angewendet?

Iberogast® ist ein pflanzliches Arzneimittel bei Magen-Darm-Erkrankungen.

Iberogast® wird angewendet zur Behandlung von funktionellen und motilitätsbedingten Magen-Darm-Erkrankungen wie Reizmägen- und Reizdarmsyndrom sowie zur unterstützenden Behandlung der

Beschwerden bei Magenschleimhautentzündung (Gastritis).

Diese Erkrankungen äußern sich vorwiegend in Beschwerden wie Magenschmerzen, Völlegefühl, Blähungen, Magen-Darm-Krämpfen, Übelkeit und Sodbrennen.

2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Iberogast® beachten?

Iberogast® darf nicht eingenommen werden:

- bei Überempfindlichkeit (Allergie) gegen die Wirkstoffe von Iberogast®;
- wenn Sie an Lebererkrankungen leiden oder in der Vorgesichte litten oder wenn Sie gleichzeitig Arzneimittel mit leberschädigenden Eigenschaften anwenden;
- bei Kindern unter 3 Jahren, da keine ausreichenden Erfahrungen vorliegen.

kommen, ist grundsätzlich ein Arzt aufzusuchen. Bei Kindern unter 6 Jahren sollte bei Bauchschmerzen grundsätzlich ein Arzt aufgesucht werden.

Bei der Einnahme von Iberogast® mit anderen Arzneimitteln:

Bisher sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Bei der Einnahme von Iberogast® zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken:

Bisher sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Schwangerschaft und Stillzeit:

Iberogast® darf von Schwangeren und Stillenden nicht eingenommen werden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch bzw. empfohlener Dosierung von Iberogast® ist keine Beeinträchtigung der Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am Straßenverkehr oder beim Bedienen von Maschinen zu erwarten.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Iberogast®:

Iberogast® enthält 31 % Alkohol.

3. Wie ist Iberogast® einzunehmen?

Soweit nicht anders verordnet, wird Iberogast® 3mal täglich vor oder zu den Mahlzeiten in etwas Flüssigkeit wie folgt eingenommen:

Erwachsene und

Jugendliche ab 13 Jahren 20 Tropfen

Kinder von 6 bis 12 Jahren 15 Tropfen

Kinder von 3 bis 5 Jahren 10 Tropfen

Wenn Sie versehentlich einmal 1 bis 2 Einzeldosen von Iberogast® mehr als vorgesehen eingenommen haben, d. h. insgesamt 40 bis 60 Tropfen, so hat dies in der Regel keine nachteiligen Folgen. Falls Sie deutlich höhere Dosen eingenommen haben, benachrichtigen Sie bitte Ihren Arzt. Dieser kann gegebenenfalls über notwendige Maßnahmen entscheiden.

Wenn Sie Iberogast® in zu großen Mengen eingenommen haben, sollen Sie beim nächsten Mal mit der Einnahme, wie vom Arzt verordnet oder in der Dosierungsanleitung beschrieben, fortfahren.

Wenn Sie die Einnahme von Iberogast® vergessen haben?

Wenn Sie die Einnahme von Iberogast® vergessen haben, sollen Sie beim nächsten Mal mit der Einnahme, wie vom Arzt verordnet oder in der Dosierungsanleitung beschrieben, fortfahren.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann Iberogast® Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Sehr selten können Überempfindlichkeitsreaktionen wie z.B. Hautausschlag, Juckreiz, Atembeschwerden auftreten.

Bei der Anwendung von Schöllkraut-haltigen Arzneimitteln sind Fälle von Leberschädigungen (Anstieg der Leberenzymwerte, des Bilirubins bis hin zu arzneimittelbedingter Gelbsucht (medikamentös-toxischer Hepatitis) sowie Fälle von Leberversagen) aufgetreten.

Meldung von Nebenwirkungen:

Bei der Anwendung von Schöllkraut-haltigen Arzneimitteln sind Fälle von Leberschädigungen (Anstieg der Leberenzymwerte, des Bilirubins bis hin zu arzneimittelbedingter Gelbsucht (medikamentös-toxischer Hepatitis) sowie Fälle von Leberversagen) aufgetreten.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de, anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, daß mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Iberogast® aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Iberogast® darf nach Ablauf des auf dem Behältnis und der äußeren Umhüllung angegebenen Verfall-datum nicht mehr verwendet werden.

Bitte nicht über +25 °C lagern!

Nach Anbruch des Behältnisses ist Iberogast® 8 Wochen haltbar.

6. Weitere Informationen:

100 ml Flüssigkeit enthalten folgende Wirkstoffe:

Darreichungsform und Inhalt: Flüssigkeit

Auszüge aus: **Iberis amara**

Originalpackung mit 20 ml N1

(Bittere Schleifenblume - Frische Ganzpflanze)

Originalpackung mit 50 ml N2

(1 : 1,5-2,5) 15,0 ml

Originalpackung mit 100 ml N3

Auszugsmittel: Ethanol 50 % (V/V)

Pharmazeutischer Unternehmer: Bayer Vital GmbH

Angelikawurzel (1 : 2,5-3,5) 10,0 ml

Kaiser-Wilhelm-Allee 70, 51373 Leverkusen

Kamillenblüten (1 : 2 -4) 20,0 ml

Deutschland

Kümmelfrüchten (1 : 2,5-3,5) 10,0 ml

Telefon: (0214) 30 51 348, Telefax: (0214) 3057209

Mariendistelfrüchten (1 : 2,5-3,5) 10,0 ml

E-Mail-Adresse: bayer-vital@bayerhealthcare.com

Melissenblättern (1 : 2,5-3,5) 10,0 ml

Hersteller: Steigerwald Arzneimittelwerk GmbH

Pfefferminzblättern (1 : 2,5-3,5) 5,0 ml

Havelstraße 5, 64295 Darmstadt, Deutschland

Schöllkraut (1 : 2,5-3,5) 10,0 ml

Stand der Information:

Süßholzwurzel (1 : 2,5-3,5) 10,0 ml

September 2018

Auszugsmittel für alle Arzneidrogen:

Ethanol 30 % (V/V)

Iberogast® enthält weniger als 0,1 Broteinheiten pro 20 Tropfen.

Apothekenpflichtig

Zul.-Nr. 6463148.00.00



Package Leaflet: Information for the User

Iberogast® oral liquid, herbal medicinal product

Read all of this leaflet carefully because it contains important information for you. This medicine is also available without a prescription. However, in order to achieve the best results, Iberogast® must be taken as instructed.

- Please keep this leaflet. You may need to read it again.
- Please ask your pharmacist if you need more information or advice.
- If your symptoms worsen or do not improve, you must contact a doctor.
- If any of the side effects gets serious, or if you notice any side effects not listed in this leaflet, please tell your doctor or pharmacist.

In this leaflet:

1. What Iberogast® is and what it is used for;
2. Before you take Iberogast®;
3. How to take Iberogast®;
4. Possible side effects;
5. How to store Iberogast®;

1. What Iberogast® is and what it is used for

Iberogast® is a herbal medicine for gastrointestinal disorders.

Iberogast® is indicated for the treatment of functional and motility-related gastrointestinal disorders such as irritable stomach and irritable bowel syndrome, as well as for the supportive treatment of the symptoms of stomach inflammation (gastritis).

These disorders manifest themselves primarily in symptoms such as stomach pain, bloating, flatulence, gastrointestinal spasms, nausea and heartburn.

2. Before you take Iberogast®

Iberogast® must not be taken

- if you are hypersensitive (allergic) to the active substances of Iberogast®;
- if you suffer from liver disease or have suffered from it in the past or if you are taking medicines with liver-damaging properties at the same time;
- by children under 3 years of age, as not enough experience has been acquired of this age group.

Take special care with Iberogast®: If signs of liver damage (yellowing of the skin or eyes, dark urine, discolored stools, pain in the upper abdomen, nausea, loss of appetite, fatigue) occur, you should stop taking Iberogast® immediately and consult a physician.

If in case of first application of Iberogast® the symptoms do not improve, a physician should be consulted after a week in order to rule out organic causes. If the symptoms worsen while you are taking Iberogast® or new symptoms occur, you should always consult a physician.

In children under 6 years a physician should always be consulted if there is abdominal pain.

Taking other medicines: There are no known interactions.

Taking Iberogast® with food and drink: There are no known interactions.

Pregnancy and breast-feeding: Iberogast® must not be taken by pregnant women and when breast-feeding.

Driving and using machines: When used as instructed with the recommended dosage, Iberogast® is not expected to impair the ability to drive a motor vehicle or use machines.

Important information about some of the ingredients of Iberogast®:

Iberogast® contains 31% alcohol.

3. How to take Iberogast®

Unless otherwise prescribed, Iberogast® is taken 3 times daily before or with meals in a little liquid as follows:

Adults and young people aged 13 years and over 20 drops, children 6-12 years 15 drops, children 3-5 years 10 drops.

There is no restriction on the length of use. The length of use depends on the type, severity and course of the disease.

Shake before use!

Please check with your doctor or pharmacist if you are not sure.

If you take more Iberogast® than you should: There have so far been no indications of an acute overdose. As a matter of principle, however, the alcohol content must be considered.

If you have accidentally taken 1 to 2 individual doses of Iberogast® more than you should, i.e. a total of 40 to 60 drops, this does not have any negative consequences as a rule. If you have taken considerably higher doses, please inform your doctor. He or she can then take a decision on any necessary measures.

If you have taken too much Iberogast®, you should continue next time with the dose prescribed by your doctor or described in the dosage instructions.

If you forget to take Iberogast®: If you have forgotten to take Iberogast®, you should continue next time with the dose prescribed by your doctor or described in the dosage instructions.

4. Possible side effects

Like all medicines, Iberogast® can cause side effects, although not everybody gets them.

In very rare cases, hypersensitivity reactions such as skin rash, itching and breathing difficulties can occur.

The use of celandine-containing drugs has led to cases of liver damage (increase in liver enzyme values, bilirubin up to drug-induced jaundice (drug-toxic hepatitis) and liver failure).

In the event of side effects you should stop taking the preparation and consult a physician. He or she can then decide on their severity and any necessary further measures.

Reporting of side effects:

If you observe any side effects, talk to your physician, pharmacist or nurse. This includes any possible side effects not listed in this leaflet. You can also report side effects directly to the Federal Institute for Drugs and Medical Devices, Department of Pharmacovigilance, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, website: www.bfarm.de. By reporting side effects, you can help provide more information on the safety of this medicine.

5. How to store Iberogast®

Store all medicines out of the reach and sight of children!

Please do not store at temperatures above +25°C!

Should Iberogast® show signs of flocculation or turbidity, these do not influence the effectiveness of the drug.

Iberogast® must not be used after the expiry date shown on the container and the outer packaging.

After the container has been opened Iberogast® can be used for a further 8 weeks.

6. Further Information:

100 ml of liquid contains the following active substances: Extracts of: Iberis amara (Bitter candytuft - fresh whole plant) (1:1.5-2.5) 15.0 ml. Extracting agent: ethanol 50% (V/V). Angelica root (1:2.5-3.0) 10.0 ml; Chamomile flowers (1:2-4) 20.0 ml; Caraway fruit (1:2.5-3.5) 10.0 ml; Milk thistle fruit (1:2.5-3.5) 10.0 ml; Balm leaves (1:2.5-3.5) 10.0 ml; Peppermint leaves (1:2.5-3.5) 5.0 ml; Celandine (1:2.5-3.5) 10.0 ml; Liquorice root (1:2.5-3.5) 10.0 ml. Extracting agent for all medicinal drugs: ethanol 30% (V/V)

Iberogast® contains less than 0.1 bread units per 20 drops.

Pharmaceutical form and content:

Liquid. Original pack containing 20 ml N1, 50 ml N2, 100 ml N3

Marketing Authorisation Holder:

Bayer Vital GmbH, Kaiser-Wilhelm-Allee 70, 51373 Leverkusen, Germany

Phone: (0214) 30 51 348, Fax: (0214) 3057209

E-mail address: bayer-vital@bayerhealthcare.com

Manufacturer:

Steigerwald Arzneimittelwerk GmbH, Havelstraße 5, 64295 Darmstadt, Germany

Information correct as of: September 2018

Only available from pharmacies

Marketing authorisation number 6463148.00.00

Liebe Patientin, lieber Patient,

das pflanzliche Kombinationspräparat Iberogast® besteht aus Extrakten aus neun Heilpflanzen, deren Inhaltsstoffe ein umfassendes Wirkspektrum (Multi-Target-Prinzip) in verschiedenen Bereichen des Verdauungssystems bieten. Dort kann Iberogast® beruhigend auf Nerven, entspannend auf Muskeln und regulierend auf die Magen-Darm-Bewegungen wirken. Zusätzlich kann Iberogast® die Bildung von Magensäure hemmen und die Magenschleimhaut schützen.

Um die Inhaltsstoffe von Iberogast® zu extrahieren, wird Alkohol verwendet. Bei einer Dosis von 20 Tropfen enthält Iberogast® sehr wenig Alkohol. Beispielsweise kann ein Glas Apfelsaft soviel Alkohol enthalten wie in 20 Tropfen Iberogast® vorhanden sind.

Magen-Darm-Beschwerden haben viele unterschiedliche Ursachen.

Magenschmerzen, Völlegefühl, Blähungen, Magen-Darm-Krämpfe, Übelkeit und Sodbrennen treten oft ohne organische Grundkrankung und häufig in Kombination auf. Man spricht deshalb auch von **funktionellen** Magen-Darm-Erkrankungen. Die Ursachen hierfür können vielfältig sein, wie z.B. empfindliche Magennerven, eine gereizte Magenschleimhaut oder eine gestörte Säureproduktion. Jedoch gehen sehr häufig die Beschwerden auf einen gestörten Bewegungsablauf (Motilität) der Magen-Darm-Muskeln zurück, sind also **motilitätsbedingt**.

So kann Iberogast® Ihnen helfen

Wenn beispielsweise der Speicher im oberen Teil des Magens (Fundus) verkrampt ist, kann

Kullanım Kilavuzu: Kullanıcı için bilgiler

Iberogast® svi, bitkisel ilaç

Sizin için önemli olan bilgilerin yer aldığı bu ilaç prospektüsünü **başından sonuna kadar okumanızı rica ve tavyise ederiz.** Bu ilaç reçetesi olarak da satın alınabilir. Ancak, tedavinin en iyi sonucu vermesi için Iberogast® kullanıldığında tıtlarının yapılmaları gerekmektedir.

• İlaç prospektüsünü lütfen okuyunuz. Onu ierde tekrar okumak isteyebilirsiniz.

• Daha başka bir ilaç veya tavyiseleye ihtiyac duyduğumuz takdirde lütfen eczaneye başvurunuz.

• Sikayetleriniz coğalduğunda veya iyileşme olmadığından mutlaka bir doktorla başvurmanız gerekmektedir.

• Belirtilen yan etkilerden birinin size ciddi sıkıntı vermemesi veya bu kullanım kılavuzunda belirtilemeyen yan etkiler fark etmeniz durumunda bunu lütfen doktorunuza söyleyin veya eczaneye bildirin.

İlaç prospektüsünün içeriği:

1. Iberogast® nedir ve ne amaca kullanılır? 2. Iberogast® alınmadan önce nelerde dikkat edilmelidir? 3. Iberogast® ne şekilde muhafaza edilmelidir? 4. Hangi yan etkiler ortaya çıkarılabilir?

Iberogast®'ın içinde bitkisel hastalıklarla kullanılan bitkisel ilaçlar.

Iberogast®'ın iritabil mide ve iritabil sağır sendromu gibi fonksiyonel ve motilite bağılı gastrintestinal hastalıkların tedavisinde kullanılır. Ayrıca mide ülserinin (gastrit) semptomatik tedavisini destekleyici bir ilaçtır.

Söz konusu hastalıkların belirtileri daha çok mide ağruları, dolgunluğunu hissetmek, sisiklik, mide-bağırsak spazmları, bulantı ve mide yanması gibi şikayetler halinde ortaya çıkar.

2. Iberogast® nedir ve ne amaca kullanılır?

Iberogast®'ın kullanımı gereken durumlar:

- Iberogast®'ın içeriğinde etkin maddeleler arasında aşırı duyarlılık (allerji) söz konusu olduğunda;

- simdi veya daha önce bir karaciğer hastalığınız olduğunda veya aynı anda karaciğerde var olan özelikerlerin yanı sıra renk değişimi;

- henüz yeterli deneyim məvcut olmadıqdan 3 yaşından küçük çocukların;

Iberogast®'ın kullanımında dikkatli olunması gereken durumlar: Karaciğerde varlığından dolayı belirtiler (cilt veya gözlerin sarı renk alması, koyu renk idrar, açık renk diş, üst karın bölgesinde ağrılar, mide bulantısı, istahsızlık, vürgünlik) görüldüğünde Iberogast®'nın birakılması bir doktora söylemeli.

Iberogast®'ın içinde bitkisel hastalıklarla kullanılan bitkisel ilaçlar.

Iberogast®'ın içeriğinde bitkisel ilaçlarla birlikte alınması gereklidir.

Iberogast®'ın başka ilaçlarla birlikte alınması gereklidir: Bugüne kadar her etkileşim bildirilmemiştir.

Iberogast®'ın gıda maddeleri ve içeceklerle birlikte alınması gereklidir: Bugüne kadar her etkileşim bildirilmemiştir.

Hamilelik ve emzirme dönemi: Hamile ve emziren kadınlar Iberogast®'ı kullanmamalıdır.

Araç ve makine kullanma kabiliyeti: Iberogast®'ın amacına uygun ve tavyise edilen dozda kullanıldığı sürece araç ve makine kullanma kabiliyetinin olumsuz etkileşimi beklenmemektedir.

Iberogast®'ın bazı diğer bilesenler hakkında önemli bilgiler: Iberogast®'ın %31 alkol içerir.

3. Iberogast® ne şekilde alınmalıdır?

Doktor tarafından başka bir ilaçla birlikte alınması gereken ilaçlarla birlikte alınmalıdır.

Erişkinler ve 13 yaşından büyük çocuklar 20 damla, 6 ile 12 yaş arası çocuklar 15 damla, 3 ile 5 yaş arası çocuklar 10 damla.

Kullanım süresi konusunda herhangi bir sınırlama yoktur. Kullanım süresi hastalığın türü, şiddet ve seyrine bağlıdır.

Kullanıldan önce kalınlık!

Emin olmadığınız zaman lütfen doktorunuza veya eczane danışınıza.

Olmasa gerekenin dahi fazla mikarda Iberogast®'ı alırmadır: Simdiye kadar bir doz asımlı bitkisel maddemiz. Ancak, ilaçın içerdigi alkol oranı genel olarak dikdik alınmalıdır.

Yanılışlıkla öngörülen 1 ila 2 tek doz Iberogast® - yanı toplam 40 ile 60 damla arası - alındığında olumsuz bir etki genellikle sonra deşarıdır.

Ancak ilaçın bundan çok daha yüksek dozlarında almış olduğumuz takdirde, lütfen doktorunuza başvurunuz. Doktorunuz gereklidine alınacak önlemler konusunda karar verecektir.

Fazla mikarda Iberogast®'ı alındığında ilaçın bir dahaki sefer doktorunun belirlediği ya da dozajı tamittanın belirtilen şekilde alımlı olmasına gerekir.

4. Hangi yan etkiler ortaya çıkarılabilir?

Bütün ilaçlar gibi Iberogast®'da yan etkilere neden olabilir, ancak bunlar her kullanıla bilir.

Çok nadiren ömr, deri doküntüsü, kaşın, nefes darlığı gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları görülebilir.

Kırlangıç otu ilaçın ilaçlanmasında, karaciğer zarar verilmesi (karaciğer enzimi ve bilirubin değerlerinin yükselmesinden ilaçla bağlı sorğu (ilac bağlı toksik hestapsı)) ve karaciğer yetmezliği kadar uzanan durumlar görülmüştür.

Yan etkiler meydana geldiğinde ilaç ekseri bir doktora başvurulmalıdır. Doktor, yan etkilerin şiddet derecesini tespit ederek gerekli olabilecek önlemleri karar verebilir.

Yan etkili bildirimi:

Kendini herhangi bir yan etki fettiginden hemen hemen, ilaç satıldığında eczacı veya yetkili tıbbi personel ile görüşüniz!

Bu prospektüle göre ilaçların etkisi hakkında bilgiye sahip bulanlıklar ortaya çıkarılmaz!

Lütfen ilaçın etkisi hakkında bilgiye sahip bulanlıklar ortaya çıkarılmıştır.

Iberogast®'ın ne şekilde muhafaza edilmelidir?

İlacı çocukların erişimeyeceğii bir yerde saklanılsın!

Iberogast®'ta görülebilecek topaklaşma veya bulanıklıklar ilaçın etkisini etmez.

Sıze üzerinde ve dış ambalajında belirtilen son kullanım tarihi geçtiğinden sonra Iberogast® kullanılmamalıdır.

Kapaklı ilk kez açıldığında sonra Iberogast® 8 hafta süreyle kullanılabilir.

6. Diğer bilgiler:

Bütün ilaçlar gibi Iberogast®'da yan etkilere neden olabilir, ancak bunlar her kullanıla bilir.

Yan etkilerin bundan ötürü ilaçın etkisi yoksa ilaçın etkisini etmez.

İberogast®'ta görülebilecek topaklaşma veya bulanıklıklar ilaçın etkisini etmez.

Sıze üzerinde ve dış ambalajında belirtilen son kullanım tarihi geçtiğinden sonra Iberogast® kullanılmamalıdır.

Kapaklı ilk kez açıldığında sonra Iberogast® 8 hafta süreyle kullanılabilir.

Sıvı 100 ml'lik orijinal ambalaj N1, 50 ml'lik orijinal ambalaj N2, 100 ml'lik orijinal ambalaj N3

Ruhsat sahibi:

Bayer Vital GmbH, Kaiser-Wilhelm-Allee 70, 51373 Leverkusen / Almanya

Telefon: (0214) 30 51 348 Faks: (0214) 3057209

E-posta: bayer-vital@bayerhealthcare.com

Üretici firma:

Steigerwald Arzneimittelwerk GmbH, Havelstraße 5, 64295 Darmstadt / Almanya

Son güncelleme tarihi: Eylül 2018

Sadece eczanelerde satılır.

Ruhsat no. 6463148.00.00

er sich bei der Nahrungsaufnahme nicht richtig ausdehnen. Völlegefühl und Krämpfe können die Folge sein. Iberogast® kann die verkrampften Muskeln des Magenspeichers entspannen und für eine ausreichende Dehnung sorgen.

Im unteren Teil des Magens, dem Transporter (Antrum), können erschlaffte Muskeln dazu führen, dass die Nahrung zu lange im Magen liegt. Iberogast® kann die Muskelbewegung im Antrum anregen und somit für eine geregelte Durchmischung und den Weitertransport der Nahrung sorgen. Blähungen, Druck und Übelkeit können damit gebessert werden.

Wenn der Druck im Magen zu groß ist, weil die Nahrung nicht weitertransportiert wird, und der Schließmuskel (Sphinkter) zwischen Speiseröhre und Magen zu schlaff ist, kann Magensäure in die Speiseröhre gelangen – Sodbrennen kann die Folge sein. Hier kann Iberogast® helfen, indem es den Druck besetzt und dadurch auf den Schließmuskel wirkt, so dass die Magensäure nicht in die Speiseröhre gelangen kann.

Das können Sie selbst für Ihren Magen tun

Hören Sie auf Ihren Bauch!

Jeder weiß selbst am besten, was ihm buchstäblich auf den Magen schlägt. Neben fetten, scharfen oder üppigen Mahlzeiten gehörten Stress und Bewegungsmangel zu den häufigsten Auslösern für Magenbeschwerden. Achten Sie daher auf eine gesunde Ernährung, eine ausgewogene Lebens-

weise und viel Bewegung an der frischen Luft. Dies ist das Beste was Sie für Magen und Darm tun können.

Bayer wünscht gute Besserung!

Bayer

4100B/0918/10.2/86590328

Iberogast®



- **beruhigt** die Magennerven
- **entspannt** die Magenmuskeln
- **reguliert** die Magenbewegung
- **hemmt** die Säurebildung
- **schützt** die Magenschleimhaut