

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

# LOMAHERPAN<sup>®</sup> Creme

0,05 g Melissenblätter-Trockenextrakt pro 5 g Creme.  
Zur Anwendung bei Kindern ab 1 Jahr und Erwachsenen.

**Lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

**Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Lomaherpan jedoch vorschriftsgemäß angewendet werden.**

- Heben Sie die Gebrauchsinformation auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder nach 10 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

## Diese Gebrauchsinformation beinhaltet:

1. Was ist Lomaherpan und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Lomaherpan beachten?
3. Wie ist Lomaherpan anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Lomaherpan aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

## 1. WAS IST LOMAHERPAN UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Lomaherpan ist ein pflanzliches Arzneimittel zur Anwendung bei Lippenbläschen.

### Anwendungsgebiete

Zur Linderung von Beschwerden bei Herpes simplex. Sofern spätestens nach 10 Tagen Behandlungsdauer die Bläschen nicht verkrustet oder abgeheilt sind, sollte ein Arzt aufgesucht werden. Bei unklaren Beschwerden bei Kindern sollte die Anwendung prinzipiell nicht ohne ärztlichen Rat erfolgen.

## 2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON LOMAHERPAN BEACHTEN?

### Lomaherpan darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen den Trockenextrakt aus Melissenblättern oder einen der Bestandteile von Lomaherpan sind.

### Bei Anwendung von Lomaherpan mit anderen Arzneimitteln

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind für Lomaherpan nicht bekannt. Informieren Sie aber trotzdem bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

### Schwangerschaft und Stillzeit

Aus der verbreiteten Anwendung von Melisse als Arznei- und Lebensmittel haben sich bisher keine Anhaltspunkte für Risiken in der Schwangerschaft und Stillzeit ergeben. Wegen nicht ausreichender Untersuchungen wird die Einnahme von Lomaherpan in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht empfohlen.

### Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Es liegen keine negativen Erkenntnisse im Zusammenhang mit der Anwendung von Lomaherpan vor und sind auch nicht zu erwarten.

### Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Lomaherpan

Keine.

## 3. WIE IST LOMAHERPAN ANZUWENDEN?

Wenden Sie Lomaherpan immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, werden 2–4-mal täglich pro cm<sup>2</sup> Hautfläche 1–2 mm bzw. 10–20 mg Creme möglichst mit einem Wattestäbchen auf die betroffenen Haut- bzw. Schleimhautbereiche aufgetragen. Beachten Sie dabei, dass unmittelbar angrenzende Bereiche mit in die Behandlung einbezogen werden. Sollte das Auftragen mit den Fingern erfolgen, waschen Sie diese vorher und nachher gründlich, um weitere Infektionen zu vermeiden.

Die Behandlung mit Lomaherpan sollte beim ersten Auftreten von Krankheitszeichen begonnen werden.

Die Behandlung mit Lomaherpan sollte bis nach dem Abklingen der Krankheitszeichen fortgeführt werden, in der Regel zwischen 3 und 10 Tagen.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Lomaherpan zu stark oder zu schwach ist.

#### Anwendungshinweise

Drehen Sie bitte die Schraubkappe von der Tube ab. In der Schraubkappe befindet sich ein Dorn, mit dem Sie durch eine Pressbewegung auf die Tubenöffnung deren Membran durchstoßen. Durch einen leichten Druck auf den Tubenmantel können Sie jetzt die Creme aus der Tube entnehmen.

#### **Wenn Sie eine größere Menge von Lomaherpan angewendet haben, als Sie sollten**

Besondere Maßnahmen sind nach den bisherigen Kenntnissen nicht erforderlich.

#### **Wenn Sie die Anwendung von Lomaherpan vergessen haben**

Grundsätzlich sollen Arzneimittel nach Verordnung des Arztes angewendet werden. Wenden Sie nicht die doppelte Dosis an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben. Wenden Sie Lomaherpan danach wie vorgesehen weiter an.

#### **Wenn Sie die Anwendung von Lomaherpan abbrechen**

Bitte wenden Sie sich vorher an Ihren Arzt oder Apotheker, dieser kann eventuelle Auswirkungen auf Ihr Befinden am besten beurteilen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

### **4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

Bedeutsame Nebenwirkungen oder Zeichen, auf die Sie achten sollten, und Maßnahmen, wenn Sie betroffen sind:

Es können Überempfindlichkeitsreaktionen wie Nesselsucht, Hautausschlag und Rötung entweder örtlich begrenzt oder am ganzen Körper auftreten.

Die Häufigkeit dieser Nebenwirkungen ist auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar.

Bei Auftreten von Überempfindlichkeitsreaktionen (z. B. Hautausschläge) muss das Arzneimittel abgesetzt und Ihr Arzt aufgesucht werden, damit er diese gegebenenfalls behandeln kann.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

### **5. WIE IST LOMAHERPAN AUFZUBEWAHREN?**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und der Tube angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Lomaherpan sollte 6 Monate nach Anbruch der Tube nicht mehr verwendet werden.

Das Arzneimittel darf nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall entsorgt werden. Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr benötigen. Diese Maßnahme hilft die Umwelt zu schützen.

### **6. WEITERE INFORMATIONEN**

#### **Was Lomaherpan enthält**

Der Wirkstoff ist:

5g Creme enthalten 0,05g Trockenextrakt aus Melissenblättern (65–75 : 1); Auszugsmittel: Wasser

Die sonstigen Bestandteile sind:

Benzylalkohol, Cetomacrogol 1000, Ethylenglycolmono/distearat, weißes Vaseline, gereinigtes Wasser

#### **Wie Lomaherpan aussieht und Inhalt der Packung**

Elfenbeinfarbene Creme in einer Aluminiumtube.

Packungsgröße 5g

#### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

INFECTOPHARM Arzneimittel und Consilium GmbH  
Von-Humboldt-Str. 1  
64646 Heppenheim  
www.infectopharm.com

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Januar 2013**