

Sanum

Notakehl® D3 Salbe



Darreichungsform:	Salbe zum Einreiben
Präparatgruppe:	Pilzpräparat
Wirkstoff:	Penicillium chrysogenum D3
Zusammensetzung:	1 g Salbe enthält: 0,10 g Penicillium chrysogenum D3 dil. (HAB, Vorschrift 5a, mit gereinigtem Wasser). Sonstige Bestandteile: 0,38 g Wollwachsalkoholsalbe, 0,10 g Mittelkettige Triglyceride, 0,03 g Glycerolmonostearat 40 - 55, 0,23 g Propylenglycol, 0,02 g Magnesiumsulfat · 7 H ₂ O, 0,01 g Milchsäure, 0,13 g Wasser für Injektionszwecke.
Erfahrungsgemäß angewendet bei:	Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.
Anwendung:	1-3x täglich dünn auf die betroffenen Hautpartien auftragen.
Nebenwirkungen:	Keine bekannt.
Gegenanzeigen:	Nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegenüber Schimmelpilzen (Penicillium chrysogenum).
Unerwünschte Reaktionen:	
Wechselwirkungen:	Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen:	Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden. Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine

ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es sollte deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden. Cetylstearylalcohol kann örtlich begrenzt Hautreizungen (z.B. Kontaktdermatitis) hervorrufen. Propylenglycol kann ebenfalls Hautreizungen hervorrufen.

Zusatzhinweis:

Dauer der Behandlung:

Handelsform: 30 g Tube, 10x 30 g Bündelpackung.

Stand vom: 912