

## GEBRAUCHSINFORMATION: Information für den Anwender

# Multilind® Heilsalbe mit Nystatin

100 000 I.E./200 mg pro 1 g  
Paste zur Anwendung auf der Haut

Wirkstoffe: Nystatin und Zinkoxid

## Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Multilind® Heilsalbe mit Nystatin jedoch vorschriftsgemäß angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihr Krankheitsbild verschlimmert oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind oder wenn Sie Erfahrungen mit einer der aufgeführten Nebenwirkungen gemacht haben, die schwerwiegend sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

### Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Multilind® und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Multilind® beachten?
3. Wie ist Multilind® anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Multilind® aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

#### 1. Was ist Multilind® und wofür wird es angewendet?

Multilind® ist ein Mittel gegen Pilzinfektionen (Antimykotikum) kombiniert mit Zinkoxid.

Hautschäden, die zunächst durch mechanische Reizung hervorgerufen wurden, können später durch Bakterien und Pilze infiziert werden. Der Wirkstoff Nystatin dient zur Vorbeugung und Behandlung von Infektionen der Haut mit Hefepilzen (z.B. Candida albicans).

Der Wirkstoff Zinkoxid eignet sich zur Behandlung entzündlicher und nässender Hautveränderungen mit oder ohne bakterielle Infektion.

#### Multilind® wird angewendet bei

- Entzündungen der Haut und Schleimhaut
- durch mechanische Reizung bedingtes Wundsein („Wolf“)
- roten, juckenden und brennenden Herden in den Körperfalten, im Gesäß- und Brustbereich und zwischen den Oberschenkeln, z.B. Windeldermatitis.

#### 2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Multilind® beachten?

##### Multilind® darf NICHT angewendet werden

- wenn Sie **überempfindlich** (allergisch) gegen die Wirkstoffe **Nystatin** und **Zinkoxid** oder **einen der sonstigen Bestandteile** von Multilind® sind.

**Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Multilind® ist erforderlich** Falls eine **Überempfindlichkeit** auftritt, sollte das Arzneimittel abgesetzt und der Arzt aufgesucht werden.

### Bei Anwendung von Multilind® mit anderen Arzneimitteln

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Es sind bisher keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln bekannt geworden.

### Hinweis für die Anwendung im Genital- oder Rektalbereich:

Bei gleichzeitiger Anwendung von Multilind® Heilsalbe mit Nystatin und Kondomen kann es zu einer Verminderung der Reißfestigkeit und damit zur Beeinträchtigung der Sicherheit von Kondomen kommen.

### Schwangerschaft und Stillzeit

Fragen Sie vor der Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Multilind® kann in der Schwangerschaft und Stillzeit verwendet werden.

### Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen sind bisher nicht bekannt geworden.

#### 3. Wie ist Multilind® anzuwenden?

Wenden Sie Multilind® immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

#### Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis

Multilind® wird ein- bis mehrmals täglich auf die betroffenen Hautstellen aufgetragen.

#### Dauer der Anwendung

Die Behandlung sollte noch einige Tage nach der vollständigen Abheilung fortgesetzt werden.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Multilind® zu stark oder zu schwach ist.



#### Anforderungscoupon

Bitte schneiden Sie diesen Anforderungscoupon aus und senden Sie ihn an: **STADA GmbH**, Stadastraße 2-18, 61118 Bad Vilbel

- Ja, ich bin an weiteren kostenlosen Informationen zu Multilind® Heilsalbe mit Nystatin interessiert und erkläre mein Einverständnis, dass meine Daten zu weiteren Informationszwecken benutzt werden.  
Eine Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet.

**Wenn Sie die Anwendung von Multilind® vergessen haben**

Führen Sie die Behandlung wie in der Dosierungsanleitung empfohlen weiter.

**Wenn Sie die Anwendung von Multilind® abbrechen**

könnte sich die Erkrankung verschlechtern.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt und Apotheker.

**4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann Multilind® Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

**Bedeutame Nebenwirkungen oder Zeichen, auf die Sie achten sollten, und Maßnahmen, wenn Sie betroffen sind**

Bei Auftreten von schweren Hautreaktionen muss das Arzneimittel abgesetzt und der Arzt aufgesucht werden.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden üblicherweise folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

Sehr häufig:	mehr als 1 Behandler von 10
Häufig:	1 bis 10 Behandelte von 100
Gelegentlich:	1 bis 10 Behandelte von 1.000
Selten:	1 bis 10 Behandelte von 10 000
Sehr selten:	weniger als 1 Behandler von 10 000
Nicht bekannt:	Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

**Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes**

Selten: Hautausschlag, Juckreiz.

**Erkrankungen des Immunsystems**

Selten: allergische Reaktionen gegen Bestandteile der Heilpaste (Nystatin, Zinkoxid, Polyethylen, dickflüssiges Paraffin, Parfümöl).

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

**5. Wie ist Multilind® aufzubewahren?**

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Die Haltbarkeit nach dem ersten Öffnen des Behältnisses beträgt 12 Monate.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Faltschachtel und der Tube bzw. Dispenser angegebenen Verfallsdatum nicht mehr anwenden.

Multilind® Heilsalbe mit Nystatin kann nach Anbruch der Tube bzw. des Dispensers über die gesamte Behandlungsdauer verwendet werden.

Nach Beendigung der Therapie sollten angebrochene Tuben oder Dispenser mit Multilind® Heilsalbe mit Nystatin für eine spätere Behandlung nicht mehr eingesetzt werden.

Arzneimittel sollten nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall entsorgt werden. Fragen Sie Ihren Apotheker wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr benötigen. Diese Maßnahme hilft die Umwelt zu schützen.

**6. Weitere Informationen****Was Multilind® enthält**

Die Wirkstoffe sind Nystatin und Zinkoxid.

1 g Paste enthält 100 000 I.E. Nystatin und 200 mg Zinkoxid.

**Die sonstigen Bestandteile sind**

Dickflüssiges Paraffin, Polyethylen, Parfümöl Citrus-Rose.

**Wie Multilind® aussieht und Inhalt der Packung**

Weißer Paste.

Multilind® ist in Tuben mit 25 g (N1) und 50 g (N2) und Dispenser mit 100 g (N3) Paste zur Anwendung auf der Haut erhältlich.

**Pharmazeutischer Unternehmer**

STADA GmbH, Stadastraße 2–18, 61118 Bad Vilbel

Telefon: 06101 603-0, Telefax: 06101 603-259, Internet: www.stada.de

**Hersteller**

STADA Arzneimittel AG, Stadastraße 2–18, 61118 Bad Vilbel

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im November 2010.

**Lieber Multilind® Kunde!**

Produktionstechnisch bedingt kann es bei dem Multilind® Dosierspender zu Luftpfeinschlüssen kommen. Diese können dazu führen, dass die Funktionsweise des Multilind® Dosierspenders eingeschränkt ist. Bitte gehen Sie dann wie folgt vor:

1. Pumpvorgang mehrmals wiederholen oder
2. mit einem Gegenstand den Hubkolben vorsichtig hochschieben, so dass der Kolben wieder Kontakt zur Salbe hat oder
3. den Dosierspender auf eine harte Unterlagen stoßen.

Liebe Eltern, liebe Patientin, lieber Patient,

Die Haut ist unser größtes Organ, das uns vor aggressiven äußeren Einflüssen schützt und den Wasser- und Wärmehaushalt für den ganzen Körper regelt. Eine intakte Haut ist insofern sehr wichtig!

Bei Babys und Kleinkindern, aber auch bei älteren Menschen ist die Barriere der Haut noch nicht voll entwickelt oder geschwächt, sodass sich schon bei leichteren Verletzungen oder wund geriebenen Stellen Mikroorganismen ansiedeln und dem Körper zusetzen können.

Bakterien und Pilze vermehren sich besonders in dem feuchtwarmen Reizklima von Einlagen und Windeln sowie durch Schwitzen in zu enger und falscher Kleidung.

Neben starker Rötung und Juckreiz treten häufig Bläschen, Krusten und Schuppung sowie nässende Absonderungen der Haut auf. Pflegeprodukte allein reichen dann nicht mehr aus.

Zur Therapie solcher Hautentzündungen (Windeldermatitis, Wolf) steht Ihnen **Multilind® Heilsalbe mit Nystatin mit den Wirkstoffen Nystatin und Zinkoxid zur Verfügung.**

Nystatin wirkt schnell und gut gegen Hefepilze und beugt erneutem Befall vor. Es ist gut verträglich, da es nur in die äußeren befallenen Hautschichten eindringt, vom Körper aber nicht aufgenommen wird.

Zinkoxid trocknet die Haut sanft ab, hemmt den Juckreiz sowie die Entzündung und bremst die Vermehrung von Bakterien.

**Multilind® Heilsalbe mit Nystatin** lässt sich durch die speziell entwickelte **Soft-Formel** leicht und schmerzlos dünn auftragen und ist ergiebig und sparsam.

Stellt sich innerhalb von wenigen Tagen keine Besserung der Beschwerden ein, sollten Sie einen Arzt aufsuchen, der die Ursachen im Einzelnen abklären kann und die weitere Behandlung übernimmt.

Sind Sie an mehr Informationen interessiert, so senden Sie uns den anhängenden Abrufcoupon oder besuchen Sie uns auf unserer Website.

9215912  
1101

STADA




---

Name: \_\_\_\_\_ PLZ/Ort: \_\_\_\_\_

---

Vorname: \_\_\_\_\_ E-Mail: \_\_\_\_\_

---

Straße: \_\_\_\_\_ Geburtsdatum: \_\_\_\_\_