



YOCON-GLENWOOD® Tabletten 5 mg



Wirkstoff: Yohimbinhydrochlorid

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese dieselben Symptome haben wie Sie.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

1. Was ist YOCON-GLENWOOD® Tabletten 5 mg und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von YOCON-GLENWOOD® Tabletten 5 mg beachten?
3. Wie ist YOCON-GLENWOOD® Tabletten 5 mg einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist YOCON-GLENWOOD® Tabletten 5 mg aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS IST YOCON-GLENWOOD® TABLETTE 5 MG UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

YOCON-GLENWOOD® Tabletten 5 mg ist ein Alpha₂-Rezeptorenblocker.

YOCON-GLENWOOD® Tabletten 5 mg wird angewendet bei:

Unterstützender Behandlung der leichten bis mittelschweren erektilen Dysfunktion im Rahmen weiterer therapeutischen Impotenzmaßnahmen.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON YOCON-GLENWOOD® TABLETTE 5 MG BEACHTEN?

YOCON-GLENWOOD® Tabletten 5 mg darf nicht eingenommen werden,

– wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile von YOCON-GLENWOOD® Tabletten 5 mg sind.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von YOCON-GLENWOOD® Tabletten 5 mg ist erforderlich,

– wenn Sie wenn Sie unter einer Herzerkrankung, Bluthochdruck, Magen- oder Darmgeschwüren, einem erhöhten Augeninnendruck (Glaukom) oder an psychiatrischen Erkrankungen, insbesondere Stimmungsstörungen oder Angstzuständen leiden. Die Einnahme von YOCON-GLENWOOD® Tabletten 5 mg kann eine bestehende Niereninsuffizienz verschlimmern. Eine eingeschränkte Funktion der Leber kann den Abbau von YOCON-GLENWOOD® Tabletten 5 mg verzögern.

Bei Einnahme von YOCON-GLENWOOD® Tabletten 5 mg mit anderen Arzneimitteln:

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Die Wirkung nachfolgend genannter Arzneistoffe bzw. Präparategruppen kann bei gleichzeitiger Behandlung mit YOCON-GLENWOOD® Tabletten 5 mg beeinflusst werden:

YOCON-GLENWOOD® Tabletten 5 mg sollte nicht zusammen mit Clonidin-Präparaten eingenommen werden, da sich die Wirkungen von Yohimbinhydrochlorid und Clonidin gegenseitig aufheben.

YOCON-GLENWOOD® Tabletten 5 mg kann die Wirkung von anderen Bluthochdruck senkenden Mitteln vermindern.

Bei der gleichzeitigen Einnahme von YOCON-GLENWOOD® Tabletten 5 mg und antidepressiv oder antipsychotisch wirkenden Arzneimitteln wird deren Wirkung bzw. Nebenwirkungen möglicherweise verstärkt.

Von einer gleichzeitigen Einnahme von Amphetaminen (Aufputschmitteln) zusammen mit YOCON-GLENWOOD® Tabletten 5 mg wird aufgrund einer möglichen Wirkungsverstärkung dringend abgeraten.

Patienten mit vorhandenen Risikofaktoren im Herz-Kreislauf-Bereich sollten eine gleichzeitige Einnahme von Medikamenten mit dem Wirkstoff Sibutramin vermeiden.

Bei Einnahme von YOCON-GLENWOOD® Tabletten 5 mg zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Während der Anwendung von YOCON-GLENWOOD® Tabletten 5 mg sollten Sie möglichst keinen Alkohol trinken.

Schwangerschaft und Stillzeit

YOCON-GLENWOOD® Tabletten 5 mg ist für die Behandlung von Frauen nicht vorgesehen.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:

Dieses Arzneimittel kann auch bei bestimmungsgemäßem Gebrauch das Reaktionsvermögen so weit verändern, dass z.B. die Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am Straßenverkehr oder zum Bedienen von Maschinen beeinträchtigt wird. Dies gilt in verstärktem Maße im Zusammenwirken mit Alkohol.

3. WIE IST YOCON-GLENWOOD® TABLETTE 5 MG EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie YOCON-GLENWOOD® Tabletten 5 mg immer genau nach der Anweisung des Arztes ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Einzeldosis für Erwachsene 1 – 2 Tabletten bis zu 3 x täglich, was einer maximalen Tagesdosis von 6 Tabletten (entsprechend 30 mg Yohimbinhydrochlorid) entspricht. Es wird empfohlen, die Therapie mit 2 x 1 Tablette pro Tag zu beginnen und die Dosis bei Bedarf schrittweise zu erhöhen.

YOCON-GLENWOOD® Tabletten 5 mg sollte jeweils nach den Mahlzeiten mit etwas Wasser eingenommen werden.

Die Behandlungsdauer richtet sich nach der Schwere des Krankheitsbildes. Sie erstreckt sich üblicherweise auf einen Zeitraum von ca. 8 Wochen. Im Allgemeinen ist mit einer Latenz von 2 – 3 Wochen ab Beginn der Einnahme bis zum Wirkungseintritt zu rechnen.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von YOCON-GLENWOOD® Tabletten 5 mg zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie eine größere Menge YOCON-GLENWOOD® Tabletten 5 mg eingenommen haben als Sie sollten,

achten Sie auf folgende Symptome: eine Überdosierung ist gekennzeichnet durch: Angstzustände, Verwirrtheit, Koordinationsstörungen, epileptische Krämpfe, Bewusstlosigkeit, erhöhter Blutdruck, Herzzrasen, vegetative Beschwerden, Schmerzen im Brustbereich, Blaufärbung der Haut bzw. Schleimhaut, Harnverhalt. In diesen Fällen kontaktieren Sie so schnell wie möglich einen Arzt.

Wenn Sie die Einnahme von YOCON-GLENWOOD® Tabletten 5 mg vergessen haben,

so sollten Sie auf die vom Arzt verordnete Menge übergehen. Eine vergessene Einzeldosis darf jedoch nicht durch eine doppelte Einzeldosis beim nächsten Einnahmezeitpunkt ausgeglichen werden.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann YOCON-GLENWOOD® Tabletten 5 mg Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

Sehr häufig:	mehr als 1 von 10 Behandelten
Häufig:	weniger als 1 von 10, aber mehr als 1 von 100 Behandelten
Gelegentlich:	weniger als 1 von 100, aber mehr als 1 von 1 000 Behandelten
Selten:	weniger als 1 von 1 000, aber mehr als 1 von 10 000 Behandelten
Sehr selten:	weniger als 1 von 10 000 Behandelten, oder unbekannt

Mögliche Nebenwirkungen:

Allgemeine Erkrankungen:

Gelegentlich: Schwitzen, Frösteln

Erkrankungen des Immunsystems:

Gelegentlich: allergische Reaktionen

Erkrankungen der Atemwege und des Brustraums:

Sehr selten: Krampf der Bronchialmuskulatur (Bronchospasmus)

Erkrankungen der Haut:

Gelegentlich: Hautrötung

Sehr selten: Hautausschlag

Erkrankungen des Nervensystems:

Häufig: Kopfschmerzen

Gelegentlich: Schwindelgefühl

Sehr selten: Zittern

Psychiatrische Störungen:

Häufig: Schlaflosigkeit, Angst, Unruhe, Reizbarkeit

Gelegentlich: Nervosität

Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems:

Gelegentlich: Steigerung des Blutdrucks und der Herzfrequenz, Herzklopfen

Sehr selten: Blutdruckerniedrigung

Erkrankungen des Verdauungstrakts:

Häufig: Übelkeit

Gelegentlich: Erbrechen, Appetitlosigkeit, Magenbeschwerden, Durchfall

Niere und Harnwege:

Häufig: verstärkter Harndrang

Sehr selten: Schmerzhaftes Blasenentleeren (Dysurie), verminderter Harndrang, Schmerzen im Genitalbereich

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn einer der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. WIE IST YOCON-GLENWOOD® TABLETTEN 5 MG AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton nach „Verw. bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Aufbewahrungsbedingungen:

Nicht über 25 °C lagern.

In der Originalverpackung aufbewahren.

6. WEITERE INFORMATIONEN**Was YOCON-GLENWOOD® Tabletten 5 mg enthält:**

Wirkstoff: 1 Tablette enthält 5 mg Yohimbinchloridhydrochlorid.

Die sonstigen Bestandteile sind:

Calciumhydrogenphosphat-Dihydrat, Povidon K 25, Mikrokristalline Cellulose, Maisstärke, Hochdisperses Siliciumdioxid, Magnesiumstearat (Ph.Eur.)

Wie YOCON-GLENWOOD® Tabletten 5 mg aussieht und Inhalt der Packung:

YOCON-GLENWOOD® Tabletten 5 mg sind weiße, runde Tabletten mit einer Einkerbung auf einer Seite und dem Eindruck „YOC 5“ auf der anderen.

YOCON-GLENWOOD® Tabletten 5 mg ist in Packungen mit 50 und 100 Tabletten erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

GLENWOOD GMBH, Postfach 1261, 82302 Starnberg, Riedener Weg 23,
82319 Starnberg, e-mail: info@glenwood.de

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Februar 2010.

64801-13