

Bekunis aktiv

Verzehrempfehlung: Erwachsene lassen 1 x täglich den Inhalt eines Sticks direkt und ohne Wasser im Munde zergehen. Nach einer Antibiotika-Therapie kann die Verzehrmenge auf 2 Sticks (2 x 1) täglich erhöht werden. Bei vorliegender Laktoseintoleranz nehmen Erwachsene zu einer milchzuckerhaltigen Speise den Inhalt eines Sticks ein. Je nach Grad der Laktoseintoleranz und der aufgenommenen Laktosemenge sollte die Dosierung individuell angepasst werden.

	1 Stick	2 Sticks
Inulin	530 mg*	1060 mg*
Laktase	46 mg* (4500 FCC**)	92 mg* (9000 FCC**)
Bifidobacterium breve	20 mg* (10 ⁹ KBE)	40 mg* (2 x 10 ⁹ KBE)
Lactobacillus plantarum	20 mg* (10 ⁹ KBE)	40 mg* (2 x 10 ⁹ KBE)

* keine Empfehlung der EU zum Tagesbedarf vorhanden

** Einheiten nach Food Chemical Codex

Zutaten: Süßungsmittel: D-Mannit, Inulin, Tamarindenkonzentrat, Trennmittel: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Hibiskusextrakt, Rhabarbersaftkonzentrat, Laktase, Bifidobacterium breve (enthält **Milch**protein, **Soja**), Lactobacillus plantarum (enthält **Milch**protein).

Hinweis: Dieses Nahrungsergänzungsmittel ist kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Die angegebene empfohlene Verzehrmenge nicht überschreiten. Bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Kein Abführmittel!

Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.