

Background limit (overflow 3mm)

Cut

Text limit

GLUE AREA ZONE

Qualität ohne Kompromisse

Novalac stellt höchste Qualitätsansprüche an die Herkunft der Inhaltsstoffe sowie deren Verarbeitung. Im Zentrum der Novalac Forschung stehen mit einer jahrzehnte langen Erfahrung und Kompetenz in der pädiatrischen Ernährungswissenschaft, die Entwicklung und das optimale Wachstum von Babys. **Novalac AR** ist Teil eines individuellen Sortiments von Säuglingsmilchnahrungen, die auf den gesamten Ernährungsbedarf von Säuglingen in den verschiedenen Entwicklungsphasen und deren besonderen Anforderungen abgestimmt sind.

ANWENDUNG

Novalac AR ist eine Spezialnahrung von Geburt an, die speziell auf die Ernährungsbedürfnisse von Säuglingen mit starkem Spucken und Aufstoßen abgestimmt ist, wenn nicht oder nur teilweise gestillt wird. **Novalac AR** enthält einen einzigartigen Komplex andickender Inhaltsstoffe unter Verwendung von Johannisbrotkernmehl und Maniokstärke sowie hydrolysierten Proteinen (aus Kuhmilch). Die Nahrung ist besonders sämig und ein Rückfluss aus dem Magen wird verhindert. **Novalac AR** ist besonders leicht und schnell verdaulich und verhindert somit ein zu langes Verweilen der Nahrung im Magen.

DOSIERUNG

Alter (Monate)	0-1	1-2
Säuglingsgewicht (kg)	4	5
Anzahl Fläschchen pro Tag	6-7	5
Anzahl Messlöffel	3-4	4
Abgekochtes Wasser (ml)	90-120	120

	2-3	3-4	4-6	>6
	6	6,5	7	>7,5
	5	5	4	3*
	4-5	6	6-7	7
	120-150	180	180-210	210

*bei zusätzlicher Nahrungsaufnahme
Standardauflösung: 13 g Pulver + 90 ml abgekochtes Trinkwasser = 100 ml trinkfertige Nahrung.
1 gestrichener Messlöffel entspricht ca. 4,3 g **Novalac AR**
Nach Absprache mit Ihrem Kinderarzt sollen Mengen und Anzahl aller Tagesmahlzeiten auf die Bedürfnisse Ihres Babys abgestimmt werden. Bitte halten Sie die Dosierungsempfehlungen genau ein.
Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät) zur diätetischen Behandlung von starkem Spucken und Aufstoßen.

WICHTIGE HINWEISE

Muttermilch ist die beste Ernährung für Ihr Baby! **Novalac AR** ist nicht für die Ernährung von gesunden Säuglingen geeignet. **Novalac AR** ist geeignet zur ausschließlichen Ernährung von Säuglingen bis zum 6. Lebensmonat. Ab dem 6. Monat sollte **Novalac AR** in Absprache mit dem Kinderarzt mit Breimahlzeiten kombiniert werden. **Novalac AR** nicht anwenden bei bekannter Kuhmilchweiß-Allergie, niedrigem Geburtsgewicht oder bei Säuglingen mit geschwächtem Immunsystem. Die Proteinquelle in **Novalac AR** ist Kuhmilch. Das Produkt ist nicht für die parenterale Ernährung geeignet. **Novalac AR** nur unter medizinischer Kontrolle verwenden.

SICHERHEITSHINWEISE

- Mindestens haltbar bis: siehe Bodenaufdruck. Nach Öffnung der Dose innerhalb von max. 3 Wochen aufbrauchen.
- Dose nach Gebrauch gut mit dem Plastikdeckel verschließen und kühl und trocken aufbewahren.
- Ein zu langes und häufiges Nuckeln bei der Gabe der Flaschennahrung vermeiden, um Karies zu verhindern.
- Putzen Sie die Zähne Ihres Babys immer nach der letzten Flasche.
- Flasche immer direkt vor dem Füttern zubereiten und nicht vorbereiten.
- Flasche innerhalb 1 Stunde nach Zubereitung verbrauchen und Reste nicht wieder aufwärmen, sondern verwerfen.

Ein Produkt von **UP Euronord SA**
ICC, Route de Pré-Bois 20, Case Postale 1876
1215 Genf - Schweiz

Vertrieb durch **careforce pharma GmbH**
Horbeller Straße 11, D-50858 Köln
www.novalac.de

e 800 g



Unter Schutzatmosphäre verpackt.

Novalac AR

Spucken und Aufstoßen



0-36 Monate

800 g

Beratungshotline 0800-6682522 (kostenlos)
www.novalac.de

ZUSAMMENSETZUNG

im Durchschnitt	100g Pulver	100ml trinkfertige Nahrung	100kcal
Energie	kcal 488,9	63,6	100
	kj 2044,8	265,8	418,2
Fett davon	g 25,1	3,3	5,1
- gesättigt	g 12,2	1,6	2,5
- einfach ungesättigt	g 6,4	0,8	1,3
- mehrfach ungesättigt	g 5,2	0,7	1,1
Kohlenhydrate davon	g 52	6,8	10,6
- Zucker	g 20,9	2,7	4,3
Ballaststoffe	g 3,3	0,4	0,7
Eiweiß	g 12,1	1,6	2,5
Natrium	g/mg 0,45/180	0,06/23,4	0,09/36,8

Mineralstoffe	mg	67,6	106,4
Kalium	mg 520	67,6	106,4
Chlorid	mg 345	44,9	70,6
Calcium	mg 460	59,8	94,1
Phosphor	mg 340	44,2	69,5
Magnesium	mg 45	5,9	9,2
Eisen	mg 6	0,8	1,2
Zink	mg 3,5	0,5	0,7
Jod	mg 100	13	20,5
Kupfer	µg 350	45,5	71,6
Mangan	µg 45	5,9	9,2
Selen	µg 9	1,2	1,8
Fluorid	µg <450	<59	<93
Chrom	µg <45	<6	<10
Molybdän	µg <45	<6	<10

Vitamine	µg RE	58,5	92
A	µg RE 450	58,5	92
B1	µg 800	52	81,8
B2	µg 800	104	163,6
B6	µg 300	39	61,4
B12	µg 1,5	0,2	0,3
C	mg 60	7,8	12,3
D3	µg 7,5	1	1,5
E	mg α-TE 11	1,4	2,2
K1	µg 30	3,9	6,1
Biotin	µg 15	2	3,1
Niacin	mg 4,5	0,6	0,9
Folsäure	µg 60	7,8	12,3
Pantothensäure	mg 2,4	0,3	0,5
Cholin	mg 60	7,8	12,3
Inositol	mg 25	3,3	5,1
Taurin	mg 44	5,7	9
L-Carnitin	mg 8	1	1,6

ZUTATEN

Maltodextrin, pflanzliche Öle (Palm-, Soja- und Kokosnussöl), Lactose (**Milch**), hydrolysierte **Milch**proteine, Andickungsmittel (Johannisbrotkernmehl), Dextrose, Maniokstärke, Emulgator: (Sojalecithin), Tricalciumphosphat, Calciumchlorid, Dikaliumphosphat, Magnesiumchlorid, Vitamine (A, B1, B2, B6, C, D3, E, K1, Biotin, Folsäure, Niacin, Pantothensäure), Kaliumhydroxid, Natriumchlorid, Monocalciumphosphat, L-Phenylalanin, Taurin, L-Tyrosin, Eisensulfat, Cholinchlorid, Zinksulfat, L-Carnitin, Antioxidationsmittel (Tocopherole), Kupfersulfat, Inositol, Trikaliumcitrat, Natriumselenit, Mangansulfat, Kaliumiodid.

Wegen der besonderen Zusammensetzung des Produktes ist es möglich, dass Sie **Novalac AR** etwas mehr schütteln müssen, um das Pulver aufzulösen. Da **Novalac AR** im Gegensatz zu Standardnahrungen bereits im Fläschchen andickt, empfehlen wir Ihnen die Verwendung eines speziellen Milchsaugers. **Novalac AR** kann kleine dunkle Teilchen pflanzlichen Ursprungs enthalten (Johannisbrotkernmehl), es besteht aber keine gesundheitliche Beeinträchtigung für Ihr Baby. Aufgrund des Inhaltsstoffes Johannisbrotkernmehl kann es außerdem zu weicheren Stühlen kommen.

ZUBEREITUNG

Für die Gesundheit Ihres Babys ist es wichtig, die Hinweise zur hygienischen Zubereitung genau zu beachten.

- Vor der Zubereitung gründlich Hände waschen. Bereiten Sie jede Flasche frisch zu. Flasche und Sauger reinigen und 10 Minuten in kochendem Wasser sterilisieren. Frisches Leitungswasser 5 Minuten lang abkochen und auf 40°C abkühlen. Oder kohensäurearmes Mineralwasser auf maximal 40°C erwärmen. Erforderliche Wassermenge in die Flasche füllen.
- Entsprechende Anzahl gestrichener – nicht gehäufte – Messlöffel Novalac hinzugeben. Bitte ausschließlich den Messlöffel aus der Packung benutzen.
- Flasche schließen und schütteln, bis das Pulver im Wasser vollständig aufgelöst ist.
- Temperatur (37°C) an der Innenseite des Handgelenks überprüfen. Sofort die Flasche geben und innerhalb einer Stunde füttern. Nahrungsreste nicht aufwärmen oder wieder verwenden.

Tin size : 127x153

Offset Label specification 800g : 412,7x143,5