

## Nutramigen\* Puramino

Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät).

Zur diätetischen Behandlung von schweren Kuhmilcheiweißallergien und multiplen Nahrungsmittelallergien durch Verwendung nicht-allergener Aminosäuren. Das Eiweiß wurde vollständig durch Aminosäuren ersetzt.

Von Geburt an.

### Wichtige Hinweise:

Nutramigen Puramino ist eine vollständig bilanzierte Diät zur ausschließlichen oder ergänzenden Ernährung von Säuglingen bis zum Ende des 6. Lebensmonats. Bei Kindern ab dem 7. Lebensmonat ist Nutramigen Puramino zur ergänzenden Ernährung geeignet. Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. - Nicht parenteral verwenden. - Muttermilch ist die beste Ernährung für Ihr Kind. Sprechen Sie vor der Anwendung dieser Nahrung mit Ihrem Arzt. Von Geburt an geeignet für Säuglinge, die mit der Flasche gefüttert werden.

Ändern Sie nicht ohne Absprache mit Ihrem Arzt die Ernährung Ihres Babys. Wenn Ihr Baby wächst, wird Ihr Arzt Sie bei Bedarf bezüglich einer geeigneten Beikost beraten. Durch seine spezielle Formulierung schmeckt und riecht Nutramigen Puramino anders als übliche Milchnahrungen. Bei Kindern, die mit dieser Nahrung gefüttert werden, kann vermehrt dünner Stuhl mit grünlicher Farbe auftreten.

Überlassen Sie Ihrem Kind die Flasche nicht zum Dauernuckeln. Häufiger oder dauernder Kontakt des Kiefers bzw. der Zähne mit kohlenhydrathaltigen Nahrungen – wie Nutramigen Puramino – kann schwere Zahnschäden hervorrufen.

### Zutaten:

Glukosesirup, pflanzliche Öle (ölsäurereiches Sonnenblumenöl, MCT-Öl aus Kokosöl/Palmkernöl, Sojaöl), Tapiokastärke, L-Asparaginsäure, L-Leucin, L-Lysin-Hydrochlorid, L-Prolin, Kaliumcitrat, L-Alanin, Calciumphosphat, L-Valin, Mononatriumglutamat, L-Isoleucin, L-Serin, L-Threonin, L-Tyrosin, L-Arginin, L-Phenylalanin, Magnesiumphosphat, Glycin, L-Cystin, L-Histidin, L-Tryptophan, Einzelleröle (Arachidonsäure von *Mortierella alpina* und Docosahexaensäure von *Cryptocodium cohnii*), L-Methionin, Natriumcitrat, Calciumcitrat, Cholinchlorid, Calciumhydroxid, Kaliumchlorid, Inositol, Ascorbinsäure, Eisensulfat, Taurin, Zinksulfat, DL-alpha-Tocopherylacetat, L-Carnitin, Nicotinamid, Retinylpalmitat, Calciumpantothenat, Kupfersulfat, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Pyridoxinhydrochlorid, Cholecalciferol, Mangansulfat, Folsäure, Natriumiodid, Natriumselenit, Phytomenadion, D-Biotin, Cyanocobalamin.

	Einheit	Pro 100 g Pulver	Pro 100 ml trinkfertig
<b>Nährwertangaben</b>			
En% = Anteil an der Nahrungsenergie			
Energie / Brennwert	kJ/kcal	2100/500	280/68
Fett (46 En%), davon:	g	26	3,6
- gesättigte Fettsäuren	g	9,9	1,35

	Einheit	Pro 100 g Pulver	Pro 100 ml trinkfertig
<b>Nährwertangaben</b> En% = Anteil an der Nahrungsenergie			
Kohlenhydrate (43 En%), davon:	g	53	7,2
- Zucker	g	4,1	0,56
Eiweiß (11 En%)	g	13,9	1,89
Salz	g	0,58	0,08
Vitamin A	µg RE	550	75
Vitamin D	µg	8,5	1,15
Vitamin E	mg α-TE	9	1,22
Vitamin K	µg	60	8,1
Vitamin C	mg	77	10,5
Thiamin (Vitamin B1)	mg	0,5	0,068
Riboflavin (Vitamin B2)	mg	0,51	0,07
Niacin	mg NE	5	0,68
Vitamin B6	mg	0,4	0,054
Folsäure	µg	97	13,3
Vitamin B12	µg	1,94	0,26
Biotin	µg	17,4	2,4
Panhotensäure	mg	3,3	0,45
Natrium	mg	230	32
Kalium	mg	550	74
Chlorid	mg	430	58
Calcium	mg	470	64
Phosphor	mg	260	35
Magnesium	mg	55	7,4
Eisen	mg	9	1,22
Zinc	mg	5	0,68
Kupfer	µg	410	56
Mangan	mg	0,13	0,018
Selen	µg	14,4	1,96
Jod	µg	103	14
Chrom	µg	9,9	1,35
Osmolarität	mOsm/l		310
Linolsäure	g	4,7	0,64
α-Linolensäure	g	0,4	0,054
Arachidonsäure (ARA)	mg	169	23
Docosahexaensäure (DHA)	mg	85	11,5
Cholin	mg	119	16,2
Inositol	mg	96	13,1
L-Carnitin	mg	11,4	1,56
Taurin	mg	35	4,7

**Dosierung:** Bitte richten Sie sich nach der vom Arzt festgelegten Dosierungsempfehlung. Diese kann von der folgenden Standardempfehlungen abweichen.

Alter	Ungefähres Körpergewicht	Anzahl Flaschen pro Tag	Wasser (ml) pro Flasche	Messlöffel† pro Flasche	Trinkmenge (ml) pro Flasche
0 – 2 Wochen	< 3 – 3,5 kg	6 – 7	90	3	100
2 – 4 Wochen	3,5 – 4 kg	5 – 6	120	4	130
1 – 2 Monate	4 – 5 kg	5	150	5	170
2 – 4 Monate	5 – 6,5 kg	4 – 5	180	6	200
4 – 6 Monate	6,5 – 7,5 kg	4	210	7	230
6 – 12 Monate	7,5 – 9,5 kg	2 – 3 #	240	8	260
> 1 Jahr	> 9,5 kg	2 – 3 #	240	8	260

† Nur den beiliegenden Messlöffel verwenden. 1 Messlöffel (4,5 g) Pulver auf 30 ml Wasser. Pulver nicht in den Messlöffel drücken. Vollen Messlöffel mit einem sauberen, trockenen Messer abstreifen.

# Wenn Kinder nicht ausreichende Mengen fester Nahrung erhalten, richten Sie sich streng nach der vom Arzt festgelegten Dosierungsempfehlung für Nutramigen Puramino.

### **Warnhinweise:**

**Für die Gesundheit Ihres Babys ist es notwendig, dass Sie die folgenden Anweisungen genau befolgen.** Sachgerechte Hygiene, Zubereitung, Dosierung, Verwendung und Lagerung der Nahrung sind für die Herstellung der Flaschenmahlzeit wichtig. Pulverförmige Säuglingsnahrungen sind nicht steril und sollten **nicht** Frühgeborenen oder Säuglingen mit Immunproblemen gefüttert werden, es sei denn auf Anweisung und unter Aufsicht Ihres Arztes. Lassen Sie sich immer von Ihrem Arzt beraten, welche Nahrung für Ihr Baby geeignet ist. Die Nichtbefolgung dieser Anweisungen kann zu schweren gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen.

### **Zubereitung der Nahrung:**

1. Vor der Zubereitung Hände gründlich mit Wasser und Seife waschen. Flasche, Sauger, Verschlusskappe und weiteres Zubehör reinigen und 1 Minute in sprudelndem Wasser auskochen.
2. Frisches Wasser 1 Minute sprudelnd kochen lassen und vor der Zubereitung auf Körpertemperatur (37° C) abkühlen lassen. Genaue Menge des abgekühlten Wassers in die Flasche füllen.
3. Exakte Menge Pulver hinzufügen (siehe Tabelle zur Dosierungsempfehlung). **Trockenen** Messlöffel in der Dose aufbewahren.

4. Flasche verschließen, zwischen den Händen hin und her rollen, dann kräftig schütteln bis sich das Pulver vollständig löst. Zur Überprüfung der Temperatur etwas Nahrung auf die Innenseite des Handgelenks tropfen lassen.
5. **Zubereitete Säuglingsnahrung kann schnell verderben. Nahrung sofort nach Zubereitung füttern. Zubereitete Nahrung nicht einfrieren** und nicht länger als 2 Stunden verwenden. Nach Fütterungsbeginn Nahrung innerhalb von 1 Stunde verbrauchen, Flasche nicht im Kühlschrank aufbewahren. Nahrungsreste verwerfen; Flasche und Zubehör gründlich reinigen.

**Warnhinweis:** Nahrung nicht in der Mikrowelle erwärmen, da dies zu ernststen Verbrühungen führen kann.

400 g e

**Lagerung:**

Dose kühl und trocken lagern. Geöffnete Dose nach Gebrauch stets gut verschließen und trocken aufbewahren. Inhalt der geöffneten Dose innerhalb von 1 Monat aufbrauchen. Pulver nicht einfrieren und vor großer Hitze schützen.

Mead Johnson Nutrition  
Middenkampweg 2  
6545 CJ Nijmegen  
Niederlande  
[www.meadjohnson.com](http://www.meadjohnson.com)



**INFECTOPHARM**

Unter Schutzatmosphäre verpackt.

\* Warenzeichen von Mead Johnson & Company, LLC  
© 2016, Mead Johnson & Company, LLC

1732100111E01  
1732100118VI01