

Cor-Vel® Truw

Salbe

Liebe Patientin, lieber Patient!

Lesen Sie bitte die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Cor-Vel® Truw jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.



Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Cor-Vel® Truw, Salbe, und wofür wird sie angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Cor-Vel® Truw beachten?
3. Wie ist Cor-Vel® Truw anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Cor-Vel® Truw aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS IST COR-VEL® TRUW, SALBE, UND WOFÜR WIRD SIE ANGEWENDET?

Cor-Vel® Truw ist ein pflanzliches Herzmittel (Cardiacum).

Cor-Vel® Truw wird angewendet zur Segmenttherapie bei nervös bedingten Herzbeschwerden.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON COR-VEL® TRUW BEACHTEN?

Cor-Vel® Truw darf nicht angewendet werden

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber ätherischen Ölen wie Fichtennadelöl, Rosmarinöl oder gegen Campher, Menthol oder einem der sonstigen Bestandteile von Cor-Vel® Truw sind,
- auf geschädigter Haut, z.B. bei Verbrennungen,
- bei Säuglingen und Kleinkindern unter 2 Jahren (Gefahr eines Kehlkopfkrampfes).

Cor-Vel® Truw soll nicht angewendet werden bei Bronchialasthma (Asthma bronchiale) und Keuchhusten.

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Cor-Vel® Truw ist erforderlich:

Bei anhaltenden oder unklaren Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die eine ärztliche Abklärung und Behandlung erfordern.

Cor-Vel® Truw ist nur zur äußerlichen Anwendung bestimmt.

Cor-Vel® Truw sollte aufgrund des hohen Camphergehaltes und der ätherischen Öle nicht in die Nähe der Augen oder in die Augen, auf Schleimhäute oder auf offene Wunden gebracht werden.

Nach der Anwendung bitte die Hände gut waschen!

Bei Kindern: Zur Anwendung von Cor-Vel® Truw, Salbe, bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Sie soll deshalb bei Kindern von 2 bis 12 Jahren nicht angewendet werden.

Bei Anwendung von Cor-Vel® Truw mit anderen Arzneimitteln:

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind nicht bekannt.

Schwangerschaft und Stillzeit: Cor-Vel® Truw soll wegen nicht ausreichender Untersuchung in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Cor-Vel® Truw:

Butylhydroxytoluol kann örtlich begrenzt Hautreizungen (z.B. Kontaktdermatitis), Reizungen der Augen und der Schleimhäute hervorrufen. Propylenglycol kann Hautreizungen hervorrufen.

3. WIE IST COR-VEL® TRUW ANZUWENDEN?

Wenden Sie Cor-Vel® Truw immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Anwendung:

2 bis 3 mal täglich wird ein 1-2 cm langer Salbenstrang in die über dem Herzen liegenden Hautbezirke und – bei ausstrahlenden Schmerzen – eine entsprechende Salbenmenge in die Unterseite des linken Oberarms einmassiert.

Dauer der Anwendung:

Wie bei allen Reiztherapien kann es nach mehrwöchiger Anwendung zu einer Gewöhnung kommen. Es wird deshalb empfohlen, in diesem Fall nach ca. 6 Wochen einen behandlungsfreien Zeitraum von 1 – 2 Wochen einzulegen.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Cor-Vel® Truw zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann Cor-Vel® Truw Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem Behandelten auftreten müssen. Bei empfindlichen Personen sind verstärkte Reizerscheinungen oder Kontaktekzeme möglich. Das Arzneimittel ist sofort abzusetzen und die betroffenen Hautpartien sind mit warmem Wasser abzuspülen.

Bei entsprechend sensibilisierten Patienten können durch Campher, Menthol oder Rosmarinöl Überempfindlichkeitsreaktionen (einschließlich Atemnot) ausgelöst werden. Krämpfe der Bronchialmuskeln (Bronchospasmen) können verstärkt werden.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte
Abt. Pharmakovigilanz
Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3
D-53175 Bonn
Website: www.bfarm.de

anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. WIE IST COR-VEL® TRUW AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Das Verfallsdatum dieser Packung ist auf der Faltschachtel und auf dem Tubenfalz aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum.

Aufbewahrungsbedingungen: Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was Cor-Vel® Truw enthält:

1 g Salbe enthält als arzneilich wirksame Bestandteile:

Campher	38 mg	Menthol	17 mg
Fichtennadelöl	29 mg	Rosmarinöl	60 mg

Die sonstigen Bestandteile sind: Aluminiumhydroxid-distearat, (2-Ethylhexyl)-palmitat, Glycerol, Glycerol-Sorbitanfettsäure-ester, Magnesiumstearat, Magnesiumsulfat-Heptahydrat, Butylhydroxytoluol, L(+)-6-O-Palmitoylascorbinsäure, Citronensäure-Monohydrat, Glycerolmonostearat, Propylenglycol, dickflüssiges Paraffin, gereinigtes Wasser.

Wie Cor-Vel® Truw aussieht und Inhalt der Packung:

Cor-Vel® Truw ist eine weiße Salbe und in Tuben mit 25 g (N1) und 50 g (N2) Salbe erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

TRUW Arzneimittel GmbH, Postfach 3150, D-33261 Gütersloh
Telefon-Nr.: 05241/30074-0, Telefax-Nr.: 05241/30074-15, e-mail: info@truw.de

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im März 2015.

Apothekenpflichtig



Zul.-Nr. 7973.00.00

Druck-Nr. 08050315 RU