

## Gebrauchsinformation

# Lecicarbon® S CO<sub>2</sub>-Laxans

Ein Zäpfchen Lecicarbon® S CO<sub>2</sub>-Laxans enthält als  
**Arzneilich wirksame Bestandteile:**  
Natriumhydrogencarbonat 125,0 mg, Natriumdihydrogenphosphat 170,0 mg.

**Sonstige Bestandteile:**  
Hartfett, (3-sn-Phosphatidyl)cholin (aus Sojabohnen), hochdisperses Siliciumdioxid.

**Darreichungsform und Packungsgrößen:**  
Packungen mit 10 Zäpfchen.

**Stoff- oder Indikationsgruppe bzw. Wirkungsweise:**  
CO<sub>2</sub>-Laxans.

**Pharmazeutischer Unternehmer:**  
**athenstaedt** GmbH & Co KG, Bahnhofstraße 11, D-82515 Wolfratshausen  
Hersteller: Haupt Pharma Livron S.A.S., 1 rue Comte de Sinaré, F-26250 Livron-sur-Drôme

**Anwendungsgebiete:**  
Zur kurzfristigen Anwendung bei verschiedenen Ursachen der Stuhlverstopfung z.B. bei schlackenarmer Kost oder mangelnder Bewegung sowie bei Erkrankungen, die eine erleichterte Stuhlentleerung erfordern. Zur Darmentleerung bei diagnostischen oder therapeutischen Maßnahmen im Enddarmbereich. Lecicarbon® S CO<sub>2</sub>-Laxans Zäpfchen können auch zusätzlich angewendet werden, wenn vorher andere Abführmittel erfolglos genommen wurden.

**Gegenanzeigen:**  
Das Arzneimittel darf nicht angewendet werden bei Darmverschluß (Ileus) und bei Megakolon (krankhafte Enddärmerweiterungen aus unterschiedlichen Ursachen), insbesondere bei Kindern und Säuglingen für alle Erkrankungen im Anal- und Rektalbereich, bei denen die Gefahr des übermäßigen Übertritts von Kohlendioxid in die Blutbahn besteht.

*Was muss in Schwangerschaft und Stillzeit beachtet werden?*  
Besondere Vorsicht bei Einnahme / Anwendung von Lecicarbon® S CO<sub>2</sub>-Laxans Zäpfchen ist erforderlich.

*Schwangerschaft*  
Sie dürfen Lecicarbon® S CO<sub>2</sub>-Laxans Zäpfchen in der Schwangerschaft nach Rücksprache mit Ihrem Arzt anwenden.

*Stillzeit*  
Sie dürfen Lecicarbon® S CO<sub>2</sub>-Laxans Zäpfchen in der Stillzeit anwenden.

**Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:**  
Nicht bekannt.

**Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:**  
Sind keine bekannt.

### **Dosierungsanleitung:**

Soweit nicht anders verordnet, bei Bedarf ein Zäpfchen einführen, gegebenenfalls kann die Anwendung nach ca. 30 Min. bis 1 Stunde wiederholt werden.

Es stehen Zäpfchen in der Dosierung für Erwachsene, Kinder und Säuglinge zur Verfügung.

Zu beachten ist die jeweilige Zäpfchenart.

Lecicarbon® S CO<sub>2</sub>-Laxans Zäpfchen dürfen über längere Zeit angewendet werden und führen nicht zur Gewöhnung. Bei chronischer Verstopfung sollte jedoch in jedem Fall der Arzt zu Rate gezogen werden.


### **Art der Anwendung:**

Zäpfchen an der Perforation vom Streifen abtrennen und Laschen mit beiden Händen anfassen und auseinanderziehen!

Zäpfchen in den After einführen. Ein kurzes vorheriges

Eintauchen in Wasser erleichtert das Einführen. Bei Kindern

eventuell beide Gesäßhälften zusammendrücken, um ein sofortiges Herauspressen des Zäpfchens zu vermeiden. Der Wirkungseintritt erfolgt nach 15 bis 30 Minuten.



### **Hinweise für den Fall der Überdosierung:**

Sind keine bekannt.

### **Nebenwirkungen:**

Sind keine bekannt.

Hinweis:

In seltenen Fällen kann das Einführen des Zäpfchens ein leichtes, schnell abklingendes Brennen verursachen.

Sollten bei der Anwendung Nebenwirkungen auftreten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

### **Hinweis:**

Nach Ablauf des Verfalldatums soll das Arzneimittel nicht mehr angewendet werden.

Nicht über 25°C aufbewahren / lagern.

### **Stand der Gebrauchsinformation:**

Januar 2009.

Weitere Patienteninformationen

**Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!**

### **Eigenschaften:**

Das Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>) bildet den Hauptbestandteil der gasförmigen Stoffwechselprodukte, die bei der Verdauung des Darminhaltes entstehen. Von allen Darmgasen regt es den Enddarm am intensivsten zu Bewegungen an.

Lecicarbon®-Suppositorien beseitigen die Verstopfung nach dem gleichen Prinzip ausschließlich durch die Zufuhr von CO<sub>2</sub>, das sich aus den Zäpfchen, nach dem Einführen in den Enddarm, langsam und feinerlig entwickelt. Das im Überschuß entstehende CO<sub>2</sub> aktiviert die Darmbewegung und löst den Entleerungsreflex im Enddarm meist innerhalb von 15 bis 30 Minuten aus.

Halten Sie sich bitte an die Anweisungen Ihres Arztes oder Apothekers. Das Medikament und dessen Dosierung ist auf Ihre bzw. des Kindes individuellen und momentanen Bedürfnisse abgestimmt. Damit Sie stets auf die Ihnen gegebenen wichtigen Informationen zurückgreifen können, legen Sie bitte nach der Anwendung diese Gebrauchsinformation zusammen mit den restlichen Zäpfchen wieder in die Faltschachtel zurück!

*Wir wünschen eine baldige und gute Besserung!*