

Sanum

Mucokehl® D7 Flüssige Verdünnung zur Injektion



Darreichungsform:	Flüssige Verdünnung zur Injektion
Präparatgruppe:	Pilzpräparat
Wirkstoff:	Mucor racemosus e volumine mycelii (lyophil., steril.) D7
Zusammensetzung:	1 ml enthält: 1 ml Mucor racemosus e volumine mycelii (lyophil., steril.) D7 aquos. dilut. (HAB, Vorschrift 5b).
Erfahrungsgemäß angewendet bei:	Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.
Anwendung:	Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren 2x wöchentlich 1 Ampulle zu 1,0 ml s.c. injizieren. Nach Anbruch etwaige nicht verbrauchte Reste verwerfen. Nach längstens 4 Wochen Therapiedauer sollte Mucokehl® D7 abgesetzt werden.
Nebenwirkungen:	Aufgrund des Gehaltes von Mucokehl® D7 an spezifischen organischen Bestandteilen können in seltenen Fällen Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten.
Gegenanzeigen:	Nicht anwenden bei • bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Schimmelpilzen (Mucor racemosus). • Kindern unter 12 Jahren • Schwangeren und Stillenden
Unerwünschte Reaktionen:	
Wechselwirkungen:	Andere immunsuppressiv wirkende Arzneimittel können die Wirksamkeit von Mucokehl® D5 beeinträchtigen. Vor und nach der Behandlung mit oral verabreichten Lebendimpfstoffen ist

ein Abstand von 4 Wochen einzuhalten.

Vorsichtsmaßnahmen:	Keine bekannt.
Zusatzhinweis:	Mucor racemosus ist als Wirkstoff auch in dem Kombinationspräparat SANKOMBI enthalten.
Dauer der Behandlung:	
Handelsform:	1/10/50 Ampullen à 1 ml.
Stand vom:	912