4 Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann Prostata-Entoxin N Nebenwirkungen haben. In seltenen Fällen können Magenbeschwerden auftreten.

Hinweis: Bei Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung).

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihren Arzt oder Apotheker mit.

5 Wie ist Prostata-Entoxin N aufzubewahren ?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Flasche nach Gebrauch stets gut verschließen.

Das Verfalldatum dieser Packung ist auf dem Flaschenetikett und auf der Faltschachtel aufgedruckt. Verwenden Sie die Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Stand der Information: Februar 2007

6 Weitere Angaben

Sie haben ein homöopathisches Arzneimittel der *MECKEL-SPENGLERSAN GmbH* erhalten. Dieses Arzneimittel ist nach den Vorschriften des offiziellen Homöopathischen Arzneibuches (HAB) Deutschlands und den internationalen Richtlinien für eine sorgfältige Herstellung (GMP) produziert worden. Sie können sich deshalb auf eine gleichbleibende Qualität unserer Arzneimittel verlassen.

Wir wünschen Ihnen baldige Besserung und Wohlbefinden.

Ihre MECKEL-SPENGLERSAN GmbH

Prostata-Entoxin® N

Gebrauchsinformation

Liebe Patientin, lieber Patient!

Lesen Sie bitte die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist auch ohne ärztliche Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss **Prostata-Entoxin N** jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihr Krankheitsbild verschlimmert oder nach 6 Wochen keine Besserung eintritt, müssen Sie einen Arzt aufsuchen.

1. Was ist Prostata-Entoxin N und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Prostata-Entoxin N beachten?
3. Wie ist Prostata-Entoxin N einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Prostata-Entoxin N aufzubewahren?
6. Weitere Angaben

Prostata-Entoxin® N

10 ml Prostata-Entoxin N enthalten als arzneilich wirksame Bestandteile:
Kreosotum Dil. D1 0,0007 ml, Populus tremuloides (HAB 34) Ø [HAB V. 3a] 0,371 ml, Sabal serrulatum Ø 0,929 ml.

Sonstiger Bestandteil: Ethanol 43,0% (m/m) 8,693 ml.
1 ml entspricht 22 Tropfen.

Prostata-Entoxin N ist eine Mischung flüssiger Verdünnungen und in Tropfflaschen mit 20 ml, 50 ml und 100 ml erhältlich.

1 Was ist Prostata-Entoxin N und wofür wird es angewendet ?

- 1.1 Prostata-Entoxin N ist ein homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen der männlichen Geschlechtsorgane.
- 1.2 von Meckel-Spenglersan GmbH · Steinfeldweg 13 · 77815 Bühl
Tel.: (07223) 3 06 71 · Fax: (07223) 87 13 · www.spenglersan.de · info@spenglersan.de
- 1.3 Das Anwendungsgebiet leitet sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehört: **Besserung der Beschwerden beim Wasserlassen bei gutartiger Prostatavergrößerung.**
Hinweis: Bei Blut im Urin, bei akuter Harnverhaltung, bei Fieber sowie bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden.

2 Was müssen Sie vor der Einnahme von Prostata-Entoxin N beachten ?

- 2.1 Prostata-Entoxin N **darf nicht von Alkoholkranken eingenommen werden.** Wegen des Alkoholgehaltes soll Prostata-Entoxin N bei Leberkranken, Epileptikern und Personen mit organischen Erkrankungen des Gehirns nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Prostata-Entoxin N ist bei Überempfindlichkeit gegen Salicylate nicht anzuwenden.
- 2.2 Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Prostata-Entoxin N ist erforderlich
 - a) bei **Kindern:**
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
 - b) für die **Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:**
es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

- c) Wichtige **Warnhinweise** zu bestimmten sonstigen Bestandteilen von Prostata-Entoxin N:
Dieses Arzneimittel enthält 51,0 Vol.-% Alkohol. Als maximale Tagesgabe nach der Dosierungsanleitung werden bei der Akutdosierung bis zu 0,54g Alkohol und bei der chronischen Dosierung bis zu 0,27g Alkohol zugeführt. Ein gesundheitliches Risiko besteht unter anderem bei Leberkranken, Epileptikern, Hirnkranken oder Hirngeschädigten sowie für Schwangere und Kinder. Die Wirkung anderer Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden.
- 2.3 **Wechselwirkungen** mit anderen Arzneimitteln:
Es sind keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln bekannt.
Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
- 3 **Wie ist Prostata-Entoxin N einzunehmen ?**
Nehmen Sie Prostata-Entoxin N immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.
 - 3.1 Art der Anwendung: Nehmen Sie die verordnete Tropfenzahl in etwas Wasser auf einmal ein. Halten Sie beim Tropfen die Glasflasche schräg in einem Winkel von 45 Grad.
 - 3.2 Falls vom Arzt nicht anders verordnet: Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen. Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen. Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren. Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.
 - 3.3 Wenn Sie eine größere Menge Prostata-Entoxin N eingenommen haben als Sie sollten, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.
 - 3.4 Wenn Sie die Einnahme von Prostata-Entoxin N vergessen haben, holen Sie diese Einnahme nicht nach, sondern fahren Sie mit der nächsten Einnahme fort.